

Protecție și energie

- Produs unic pe piața insecticidelor cu aplicare la sol
- Fiecare granulă conține insecticid și fertilizant microgranulat starter
- Spectru larg de acțiune și număr mare de culturi la care este omologat

TRIKA[®]
expert



Protecție eficientă datorită celor două substanțe active



Efect de lungă durată



Amestec gata pregătit



- Tehnologie inovatoare de ultimă generație – tip **G Plus**
- Protecție și energie radiculară în aceeași granulă
- Eficacitate prelungită (aproximativ 60 de zile) datorită eliberării controlate
- Substanță activă – **Lambda-Cihalotrin** + fertilizant organomineral cu efect starter (fosfor 35% - azot 7%)

ELEMENTE CHEIE

SUBSTANȚĂ ACTIVĂ



Lambda-Cihalotrin

FORMULARE



Tehnologie **G Plus**

PERFORMANȚĂ



Eficacitate și durabilitate

APLICARE




Distribuire la sol

PROTECȚIE ȘI ENERGIE


Lambda-Cihalotrin

- Moleculă de sinteză din grupa piretroizilor, cu acțiune de contact și ingestie și putere de combatere ridicată
- Are și efect repelent
- Produs sigur pentru culturi sănătoase




Suport cu efect de starter

- Microgranulele care înglobează substanța activă Lambda-Cihalotrin și elementele nutritive (fosfor 35% - azot 7%) cu efect starter sunt îmbogățite cu substanțe humice pentru asigurarea energiei radiculare
- Fertilizantul organomineral asigură o dezvoltare rapidă și viguroasă a sistemului radicular, făcându-l mai rezistent la atacurile dăunătorilor
- Fosforul este solubil și asimilabil de către plantă
- Energia radiculară în sinergie cu protecția împotriva dăunătorilor de sol conferă un start sigur culturilor tratate cu **TRIKA Expert**



TESTE DE EFICACITATE



Locație: **Italia**


Perioada: **2012-2013**

■ TRIKA Expert
■ Standard de referință piretroid

Locație: **Spania** Perioadă: **2013**

Cultură: **Cartof (Elite 40-55)**

Dăunător: **Viermi sârmă**
(*Agriotes linneatus*)



■ Eficiență

■ Media numărului de găuri/tubercul



Martor

Locație: **Vicenza, Italia**

Perioadă: **2013**


Dăunător: **Diabrotica spp.**

Indice IOWA

■ IOWA < 0,7 (fără pagube)

■ IOWA 0,7-1,5 (necesită atenție)

■ IOWA > 1,5 (pagube însemnate)



Martor



TRIKA Expert

RECOMANDĂRI DE UTILIZARE



Viermi sârmă
(*Agriotes spp.*)



Viermele vestic al tulpinilor de porumb
(*Diabrotica virgifera*)



Buha semănturilor
(*Agrotis spp.*)



Cărbușul de mai
(*Melolontha spp.*)

Cultură	Organismul dăunător	Perioadă de aplicare	Doză
<ul style="list-style-type: none"> • Porumb • Sorg • Mei 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă în sol odată cu semănatul	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Floarea-soarelui 	Viermele vestic al tulpinilor de porumb, în faza de larve (<i>Diabrotica spp.</i>)	Aplicat de-a lungul rândului odată cu prima prașilă mecanică, când planta are 5-8 frunze (BBCH 15-18)	12-15 kg/ha
	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă în sol odată cu semănatul	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)			
<ul style="list-style-type: none"> • Rapiță • Soia 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă în sol odată cu semănatul	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Cartof 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă la sol odată cu plantarea	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Morcov 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă în sol odată cu semănatul	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Castraveți • Dovleac • Dovlecel • Pepene roșu • Pepene galben 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă la sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Tomate • Vinete • Ardei • Salată (salată verde, salată pentru tăiat, salată iceberg, salată romană, andivă, cicoare, ridichi, salată creastă, măcriș, rucola, frunze și germeni de varzoase) • Spanac 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă la sol odată cu plantarea, când planta are 2-6 frunze (BBCH 12-16)	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Vârză pentru căpățână (varză, varză verde) • Conopidă • Broccoli • Nap 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă la sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Culturi pentru producere de sămânță (varză, cucurbitacee, salată, porumb, rapiță, morcov, cartof și alte solanacee) 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare la sol odată cu semănatul pentru culturile semănate. La culturile replantate se aplică direct la sol odată cu plantarea (BBCH 12-14)	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
	Viermele vestic al tulpinilor de porumb, în faza de larve (<i>Diabrotica spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Flori și plante ornamentale • Pepiniere de arbori 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă la sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		
<ul style="list-style-type: none"> • Tutun 	Larvele de buha semănturilor (<i>Agrotis spp.</i>)	Aplicare directă la sol odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)	10-15 kg/ha
	Larvele cărbușului de mai (<i>Melolontha spp.</i>)		
	Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>)		


APLICARE ȘI DOZAJ

- **TRIKA Expert** se încorporează în sol odată cu semănatul, cu ajutorul aplicatorului de fertilizanți microgranulați
- **TRIKA Expert** folosește tehnologia inovatoare de tip **G Plus**, care asigură o eliberare lentă formând un halou în jurul seminței

Doza recomandată:

10-15 kg/ha

localizat pe rând,
aplicat odată cu
semănatul



BENEFICIILE

Dublu efect:

- Protecție: insecticid cu spectru larg de acțiune
- Energie: fertilizant organo-mineral starter
- Protecție + Energie = Producție sporită



Perfecțiunea detaliului prin tehnologia G Plus:

- granulație 0,5-0,6 mm
- necoroziv
- pH 5