



SUMIAGRO

Experiență și tehnologie japoneză

Catalog produse

A vibrant, stylized illustration of a Japanese agricultural landscape. In the foreground, a man in a white lab coat waters a large, blossoming pink cherry tree with a purple watering can. To the right, a woman in a red kimono holds a large white parasol, and a man in a blue kimono and straw hat holds a large bowl of harvested corn. The background features a blue tractor, a red bridge, a traditional Japanese house, and a snow-capped mountain under a bright yellow sun with rays. A black bird flies in the sky.

Produsele descrise în acest catalog sunt omologate și autorizate
de către ministerele competente pentru a fi folosite pe teritoriul României.
Imaginile au titlu de prezentare, iar recomandările sunt de ordin general.
CITIȚI TOATE CELELALTE MĂSURI DE SIGURANȚĂ ȘI INSTRUȚIUNILE DE UTILIZARE ÎNAINTE DE FOLOSIREA PRODUSULUI!

The logo for SUMIAGRO is a circular emblem. It features a dark blue outer ring and a white inner circle. The word "SUMI" is written in a bold, dark blue, sans-serif font within the white circle, and the word "AGRO" is written in a white, sans-serif font within the dark blue ring. The logo is positioned on the right side of the page, with a white curved line extending from it towards the top right corner.

SUMIAGRO

Experiență și tehnologie japoneză

CUPRINS

INSECTICIDE
Fury 10 EC 15
Mospilan 20 SG 6
Mospilan 20 SG + Toil 5
Trika Expert 10
Wizard 13

ACARICIDE
Kanemite SC 16
Nissorun 10 WP 19

INSECTO-ACARICIDE
Sanmite 10 SC 20

MOLUSCOCIDE
Optimol 22

FUNGICIDE
Buzz Ultra DF 27
Cyflamid 5 EW 28
Cupertine Super 30
Drago 76 WP 31
Fantic M 32
Lieto 33
Syllit 400 SC 34
Topsin 70 WDG 35
Triumf 40 WG 36
Yamato 37

ERBICIDE
Arbiter 42
Assault  44
Barracuda 45
Click Pro  46
Lancelot Super 50
Nisshin 4 SC 41
Pledge 50 WP 49
Targa Super 5 EC 53

ADJUVANȚI ȘI DEZINFECTANȚI SOL
ADJUVANȚI
Flexi 58
IMPROVE 5 în 1 59
Toil 58

DEZINFECTANȚI SOL
Nemasol 510 60

FERTILIZANȚI
Elite 66
Fertigofol Ultra 63
Sulfomax Fluid 64

GAMA BIO – SEIPRO
BrasiPro 69
Kaishi 70
Kinactiv Fruit 72
Kinactiv Root 74
NoFly WP 76
Shigeki 78

PROGRAM DE TRATAMENTE
Grâu 83
Porumb 83
Floarea-soarelui 84
Rapiță 84
Cartof 85
Soia 85
Castravete 86
Varză 86
Tomate 87
Măr 87
Viță de vie 88
Căpșun 88

UTILE
Tabel calcul doze 91
Tabel calcul concentrații 92



INSECTICIDE
Fury 10 EC 15
Mospilan 20 SG 6
Mospilan 20 SG + Toil 5
Trika Expert 10
Wizard 13

ACARICIDE
Kanemite SC 16
Nissorun 10 WP 19

INSECTO-ACARICIDE
Sanmite 10 SC 20

MOLUSCOCIDE
Optimol 22





Noul etalon în pomicultură



INSECTICID

Ambalaje: Mospilan 20 SG
1 Kg și 4x150g
Toil - 1 L și 5 L

MOSPILAN 20 SG + TOIL este un amestec (tank mix) destinat în principal tratamentelor prevegetative în pomicultură.

Certificat de omologare pentru **MOSPILAN 20 SG** nr. 2616 din 02.03.2006

Substanța activă: **Acetamiprid + ulei vegetal** • Formulare: SG (Granule solubile)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Măr, prun	Păduchele din San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>) (larve hibernante) Păianjenul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>) (ouă de iarnă) Afide (<i>Aphis spp.</i>) (ouă de iarnă)	Mospilan 20 SG 0,450 kg/ha + 0,5% Adjuvant (tratament de iarnă)

Caracteristici tehnice

- **MOSPILAN 20 SG** + TOIL combate cu mare eficacitate păduchii țestoși, în special păduchele din San Jose, atât prin imobilizarea acestora, dar și prin penetrarea scutului protector.
- De asemenea are efect asfixiant asupra ouălor de acarieni, afide și cotari.
- Amestecul **MOSPILAN 20 SG** + TOIL nu produce fitotoxicitate pomilor indiferent de faza de vegetație la momentul aplicării.
- TOIL este un adjuvant special creat pentru a îmbunătăți acțiunea produselor pentru protecția plantelor cu care se utilizează în combinație.
- Eficacitate de lungă durată, peste 30 zile, ceea ce ajută la o reducere a numărului de tratamente convenționale.
- Este selectiv și nu afectează fauna utilă.

Recomandări de utilizare


- Tratamentul cu **MOSPILAN 20 SG** + TOIL se aplică la sfârșitul repausului vegetativ – începutul dez mugurului (faza de "urechiușe de șoarece" la măr și de "buton verde" la prun). Temperatura aerului trebuie să fie mai mare de +4° C iar cantitatea de soluție folosită la hectar între 1000 -1500 L, în funcție de talia pomilor (cantitatea de TOIL diferă în funcție de volumul de apă).
- Se va urmări o acoperire cât mai uniformă a ramurilor și tulpinii, fără a produce șiroiri.



Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Măr	Păduchele verde al mărului (<i>Aphis pomi</i>)	0,3 kg/ha (0,02%)
	Afide (<i>Aphis spp.</i>)	0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă)
	Păduchele lănos (<i>Eriosoma lanigerum</i>)	0,3 kg/ha (0,02%)
	Acarianul roșu al pomilor (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă)
	Păduchele din San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	0,375-0,450 kg/ha (0,025-0,03%) (generația de vară aplicat la apariția formelor mobile)
	Păduchele din San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant (tratament de iarnă)
	Afide (<i>Aphis spp.</i> (ouă de iarnă))	0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant
Prun	Acarianul roșu al pomilor (<i>Panonychus ulmi</i> (ouă de iarnă))	0,450 kg/ha + 0,5% adjuvant
	Păduchele din San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	0,250-0,300 kg/ha (0,025-0,03%) (generația de vară aplicat la apariția formelor mobile)
	Păduchele din San Jose (<i>Quadraspidiotus perniciosus</i>)	0,450 kg/ha + 0,5 % adjuvant (tratament de iarnă)
Păr	Puricele melifer (<i>Cacopsylla spp.</i>)	0,2 kg/ha (0,02%)
Cartofi	Afide (<i>Aphis spp.</i>)	0,100 kg/ha
	Gândacul din Colorado (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	
Rapiță	Viespea rapiței (<i>Athalia rosae</i>)	0,150 kg/ha
	Gândacul lucios al rapiței (<i>Meligethes aeneus</i>)	
	Gărgărița tulpinilor (<i>Ceutorhynchus napi</i>)	
Varză	Păduchele cenușiu (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0,075 kg/ha (0,0125%)
	Buha verzei (<i>Mamestra brassicae</i>)	0,150 kg/ha (0,025%)
Grâu	Ploșnița cerealelor (<i>Eurygaster integriceps</i>)	0,1 kg/ha
Castraveți solarii	Tripsul californian (<i>Frankliniella occidentalis</i>)	0,4 kg/ha (0,04%)
	Musculița albă de seară (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,250 kg/ha (0,025%)
Ardei solarii	Păduchele verde al piersicului (<i>Myzus persicae</i>)	0,125 kg/ha (0,0125%)
Ardei câmp	Păduchele verde al piersicului (<i>Myzus persicae</i>)	0,125 kg/ha (0,0125%)
Viță de vie	Molia strugurilor (<i>Lobesia botrana</i>)	0,250 kg/ha
Porumb	Gărgărița frunzelor de porumb (<i>Tanymecus dilaticollis</i>)	0,1 kg/ha
Ceapă	Tripsul tutunului (<i>Thrips tabaci</i>)	0,2 kg/ha

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



Caracteristici tehnice

- Combate dăunătorii în toate stadiile de dezvoltare (ou - larvă - adult).
- Are efect rapid, afectând sistemul nervos al insectelor care paralizează și mor.
- Produsul este absorbit rapid în plantă.
- Eficacitatea nu este condiționată de temperatura aerului.
- Rezistență foarte bună la spălare (ploi, irigare, aspersie).
- Durată lungă de protecție - peste trei săptămâni.
- Perioadă scurtă de pauză de la aplicare până la recoltare.

Recomandări de utilizare

- **MOSPILAN 20 SG** combate foarte bine un spectru larg de dăunători din principalele culturi agricole. Pentru mărirea spectrului de combatere și evitarea creării formelor rezistente se vor alterna tratamentele cu insecticide din altă grupă chimică (ex. **FURY 10 EC**, **Wizard**).
- Pentru eficacitatea maximă a tratamentului, se recomandă utilizarea unor cantități corespunzătoare de soluție la unitatea de suprafață precum și o bună reglare a mașinilor de stropit.
- Prezintă toxicitate scăzută pentru om, animale și mediu.
- Este prietenos cu entomofauna utilă.

MOSPILAN 20 SG este disponibil în **ambalaje NOI**:
Insecticidul consacrat, mai ușor de utilizat!

Cutie cu 4 **PLICURI HIDROSOLUBILE** de 150 g
Plicul se dizolvă ușor, nu există contact cu produsul.



Câștigi timp și extra siguranță!

Noul ambalaj de 1 kg: bidon HDPE ce face produsul mai sigur de transportat și utilizat

Mospilan[®]

20 SG

Eficient și plurivalent



Insecticid sistemic cu efect rapid
și durată lungă de acțiune



Prietenos cu entomofauna utilă



Eficacitate mare, chiar și la
temperaturi variate



Perioadă de pauză scurtă
de la aplicare până la recoltare



Este absorbit repede în plantă
și are rezistență bună la spălare



TRIKA[®]

expert

Protecție și energie



Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Porumb, Sorg, Mei	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
	Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)	12-15 kg/ha Aplicat de-a lungul rândului, odată cu semănatul
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
Floarea-soarelui	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
Morcov	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
Tomate, vinete, ardei, salată (salată verde, salată pentru tăiat, salată iceberg, salată romană, andive, cicoare, ridichi, salată crească, măcriș, rucola, spanac, frunze și germeni de varzoase)	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-6 frunze (BBCH 12-16)
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
Castraveți, dovleac, dovlecel, pepene roșu, pepene galben	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
Vărză pentru căpățână (varză, varză verde), conopidă, broccoli, nap	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
Rapiță, Soia	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă în sol, odată cu semănatul

Testat cu succes în locațiile APPR în 2017-2018.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Flori și plante ornamentale, Pepiniere de arbori	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica spp.</i>)	10-15 kg/ha Aplicare directă la sol, odată cu plantarea, când planta are 2-4 frunze (BBCH 12-14)
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)	10-15 kg/ha Aplicare la sol, odată cu semănatul pentru cul- turile semănate. La culturile replantate se aplică direct la sol, odată cu plantarea (BBCH 12-14)
	Buha semănăturilor (<i>Agrotis spp.</i>) Cărbușul de mai (<i>Melolontha melolontha</i>) Viermele sârmă (<i>Agriotes spp.</i>) Viermele vestic al rădăcinilor de porumb (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)	10-15 kg/ha Aplicare la sol, odată cu semănatul pentru cul- turile semănate. La culturile replantate se aplică direct la sol, odată cu plantarea (BBCH 12-14)

Caracteristici tehnice

- Insecticid din grupa piretroizilor de sinteză, care acționează prin contact și ingestie, protejând culturile agricole.
- Are acțiunea de șoc și efect repelent.
- Odată ajunsă în corpul insectei, substanța activă este rapid translocată și acționează asupra sistemului nervos.
- **Insecticid UNIC** pe piața produselor de protecția plantelor din România, datorită formulării (insecticid și suport organo-mineral cu efect de starter).
- Formulă după o tehnologie inovatoare de tip G Plus. Granula de produs (granulație Ø 0,5 – 0,6 mm), este un amestec omogen de lambda-cihalotrin și suport organo-mineral (suport organic de natură humică, Azot 7% și Fosfor 35%).
- Rădăcina plantei de cultură este protejată împotriva atacului insectelor de sol datorită efectului de halou creat de molecula de insecticid și are acces imediat la elementele nutritive (azot și fosfor) eliberate de substratul nutritiv.
- Alternativă de protecție a culturilor agricole (împreună cu tratamente în vegetație), pentru combaterea dăunătorilor problemă, în zonele unde este interzisă folosirea de sămânță tratată cu produse din gama neonicotinoidelor.
- **Formulare unică**
 - FOSFOR (35%) - Conținut ridicat de fosfor solubil, ușor accesibil plantelor de cultură
 - AZOT (7%) - Element de natură organo-minerală, cu rol în facilitarea absorbției de fosfor în perioada de formare a rădăcinii și a tinerei plante în primele faze de dezvoltare
 - Suportul organic de natură humică → Are rolul de a îmbunătăți capacitatea de absorbție a rădăcinilor și stimulează procesul de asimilare a azotului și fosforului de către plante

Recomandări de utilizare

- Aplicare direct în sol, odată cu semănatul sau transplantatul (în cazul culturilor transplantate).
- Din încercările făcute de Summit Agro România, rezultate foarte bune în protecția culturilor au fost obținute, folosind produsul în aplicare fazială.
- Pe terenurile cu rezervă mare de dăunători vă recomandăm să utilizați produsul în aplicare fazială (la plantat și în vegetație, la rebilonare sau prașilă mecanică) cât și lucrări agrotehnice (arături adânci, rotația culturilor).
- La cultura de cartof recomandăm utilizarea produsului Trika Expert prin aplicare fazială, și anume:
 - 10 kg/ha aplicat odată cu plantarea tubercuilor și
 - 10 kg/ha aplicat odată cu lucrarea de rebilonare
- La culturile prașitoare recomandăm de asemenea aplicare fazială astfel: spanac 10 kg/ha la semănat și 10kg/ha odată cu prima prașilă mecanică.
- Folosiți echipamentul de protecție în timpul procesului de manipulare și administrare (salopetă/combinezon de bumbac, mănuși de protecție și filtru respirator de tip P1).
- Folosiți produsul aplicând doza testată și omologată, doar pentru protecția culturilor la care a fost testat și omologat (vezi recomandări de utilizare).
- Preveniți prin orice măsuri ca produsul să ajungă în apele de suprafață, ape subterane, sistemul de canalizare sau drenaj.

WIZARD

Vrăjitorul culturilor curate



WIZARD

INSECTICID

Ambalaje: 1 L

WIZARD este un insecticid condiționat sub formă de lichid limpede, omogen, mobil, de culoare galben deschis.

Certificat de omologare nr. 1526 din 11.03.1994

Substanța activă: **Esfenvalerat 5%** • Formulare: EC (Emulsie concentrată)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Grâu	Ploșnița cerealelor (<i>Eurygaster integriceps</i>), Gândacul bălos (<i>Lema melanopa</i>)	0,2 L/ha
Varză	Buha verzei (<i>Mamestra brassicae</i>)	0,15 L/ha
Măr	Viermele mărului (<i>Cydia pomonella</i>), Minierul marmorat (<i>Phyllonorycter blancardella</i>), Minierul circular (<i>Leucoptera scitella</i>)	0,3 L/ha (0,02%)
Viță de vie	Molia viței de vie (<i>Lobesia botrana</i>)	0,2 L/ha (în 1000 L apă)
	Păduchele cenușiu (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	0,2 L/ha
Rapiță	Gărgărița rapiței (<i>Ceutorhynchus napi</i>), Gândacul lucios (<i>Meligethes aeneus</i>)	0,25 L/ha

Caracteristici tehnice

- WIZARD acționează prin contact și ingestie, protejând culturile agricole nu numai prin acțiunea sa insecticidă, de șoc, dar și prin efectul repelent asupra insectelor.
- WIZARD prezintă acțiune reziduală suficientă chiar și în condiții de acțiune directă a razelor solare. Produs cu eficiență economică foarte bună la doze reduse. Combate un spectru larg de insecte.
- Este eficient împotriva insectelor rezistente la insecticidele din gama organoclorice, organofosforice sau carbamați.
- Esfenvalerat este un piretroid de sinteză inventat de Sumitomo Chemical.
- Esfenvalerat este cel mai activ S,S-izomer al substanței fenvalerat (echivalent al unui amestec de 4 izomeri), care oferă performanțe ridicate la doze scăzute, având o fito-toxicitate scăzută.
- Fotostabilitatea piretroidilor sintetici depinde de structura lor chimică. Cei mai mulți piretroizi au un fragment de acid vinil-ciclopil, care este cunoscut ca fiind sensibil la lumină. Esfenvalerat este diferit, având o degradare mult mai lentă la lumina soarelui.

Recomandări de utilizare

- Tratamentele se execută la avertizare. WIZARD nu prezintă riscuri asupra mediului înconjurător la dozele recomandate de utilizare. Produsul se fixează în complexul coloidal al solului și este degradat rapid.
- Produsul este toxic pentru albine numai în momentul aplicării, ulterior, datorită acțiunii repelente, albinele sunt îndepărtate din cultura tratată.
- La pregătirea soluției se va umple rezervorul pompei de stropit până la jumătate cu apă și apoi se adaugă produsul, continuând umplerea rezervorului sub agitare continuă.
- WIZARD se aplică prin stropiri foliare. Doza de produs recomandată se aplică într-un volum de apă între 200 și 1500 L/ha în funcție de volumul masei foliare (cu menținerea concentrației recomandate) astfel încât să se asigure o acoperire cât mai uniformă și completă.
- Produsul este compatibil cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor. Pentru o folosire corectă se recomandă consultarea tabelor de compatibilitate și se va face un test în prealabil.
- Se recomandă alternarea cu produse cu mod diferit de acțiune în cadrul programului de tehnologie de protecție anual.
- Între ultimul tratament și recoltare se asigură un timp de pauză de 7 zile.

Cuvânt de avertizare: **PERICOL**

Pictograme de pericol:





Protejează investiția.
Returnează profitul.



FURY 10 EC este un insecticid cu un spectru larg de combatere a dăunătorilor din agricultură.

INSECTICID

Certificat de omologare nr. 1529 din 11.03.1994

Substanța activă: Zeta-cipermetrin 100 g/L • Formulare: EC (Emulsie concentrată)

Ambalaje: 1 L și 5 L

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Grâu	Ploșnița cerealelor (<i>Eurygaster integriceps</i>)	0,1 L/ha
	Gândacul bălos (<i>Lema melanopa</i>)	
Cartof	Gândacul din Colorado (<i>Leptinotarsa decemlineata</i>)	0,075 L/ha
Varză	Buha verzei (<i>Mamestra brassicae</i>)	0,02%
	Păduchele cenușiu (<i>Brevicoryne brassicae</i>)	
	Fluturele alb al verzei (<i>Pieris brassicae</i>)	
Viță de vie	Molia strugurilor (<i>Lobesia botrana</i>)	0,2 L/ha
Pomi fructiferi	Omida păroasă (<i>Hyphantria cunea</i>)	0,01%
Pomi Culturi de câmp	Lăcuste (<i>Locusta migratoria</i>)	0,02%
Porumb	Viermele vestic al rădăcinilor (<i>Diabrotica virgifera virgifera</i>)	0,2 L/ha – adulți (1-2 tratamente)
Rapiță	Viespea rapiței (<i>Athalia rosae</i>)	0,2 L/ha
	Gândacul lucios al rapiței (<i>Meligethes aeneus</i>)	

Caracteristici tehnice

- Acționează asupra sistemului nervos al insectelor prin contact și prin ingestie.
- Efectul său este de șoc, dar și repelent, insectele evitând culturile tratate.
- Efect rapid asupra insectelor țintă.
- Combate dăunătorii în stadiul de larvă și adult.
- Cost redus raportat la unitatea de suprafață.

Recomandări de utilizare

- Se va evita aplicarea produsului la temperaturi de peste 22-24°C.
- Produs repelent pentru albine. A se evita aplicarea în perioada înfloritului pentru a nu afecta albinele.

Cuvânt de avertizare: PERICOL

Pictograme de pericol:



Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Vinete, tomate (spații protejate)	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	Pentru plante cu înălțimea <50 cm: 0,625 L/ha în 600 L apă
		Pentru plante cu înălțimea între 50 – 125 cm: 0,938 L/ha în 900 L apă
		Pentru plante cu înălțimea > 125 cm: 1,25 L/ha în 1200 L apă
Măr, păr	Păianjenul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,625 L/ha pentru fiecare metru înălțime coroană
Hamei	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,5 L/ha
Plante ornamentale (spații protejate)	Păianjenul roșu, păianjenul roșu comun (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	Pentru plante cu înălțimea <50 cm: 1,25 L/ha în 1000 L apă
		Pentru plante cu înălțimea 50 – 125 cm: 1,87 L/ha în 1500 L apă
		Pentru plante cu înălțimea > 125 cm: 2,5 L/ha în 2000 L apă
Plante ornamentale	Păianjenul roșu, păianjenul roșu comun (<i>Panonychus ulmi</i> , <i>Tetranychus urticae</i>)	Pentru plante cu înălțimea <50 cm: 1,25 L/ha în 1000 L apă
		Pentru plante cu înălțimea între 50 – 125 cm: 1,87 L/ha în 1500 L apă

Caracteristici tehnice

- Mod unic de acțiune: inhibă producerea ATP-ului în mitocondrie
- Efect de knockdown (rapid), rezidual, asigurând o protecție de lungă durată
- Eficacitate foarte bună în combaterea acarienilor, în toate stadiile de dezvoltare (de la ou la adult)
- Excelentă eficacitate la temperaturi scăzute.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



Recomandări de utilizare

- **KANEMITE SC** este un acaricid destinat combaterii păianjenului roșu comun (*Tetranychus urticae*) și păianjenului roșu (*Panonychus ulmi*) din pomicultură, legume și plante ornamentale (culturi în câmp deschis sau în spații protejate).
- Se administrează folosind echipamente specifice culturilor de câmp sau din spații protejate. Volumul de soluție este cel specific fiecărei culturi, menționat în tabelul alăturat.
- Se aplică atunci când populațiile de acarieni au atins pragul economic de dăunare, așa cum este determinat prin monitorizarea locală. Nu așteptați până când s-au instalat populații mari de acarieni. Pentru un control optim, recomandăm folosirea instalațiilor adecvate, pentru a realiza o pulverizare corectă a produsului (folosirea presiunii adecvate, duze recomandate). Pentru fructele semănțoase, **KANEMITE SC** se aplică utilizând un volum de apă suficient, astfel încât să se asigure o acoperire uniformă și temeinică a aparatului foliar.
- Pentru evitarea formelor de rezistență, se vor alterna tratamentele cu alte produse.
- **KANEMITE SC** nu se amestecă cu produse cuprice, produse pe bază de fosfite de aluminiu și fertilizanți foliați.
- Este un acaricid recomandat pentru managementul combaterii integrate, folosindu-se în alternanță cu alte acaricide cu mod de acțiune diferit.
- **KANEMITE SC** se caracterizează printr-o toxicitate scăzută asupra mamiferelor și albinelor. Nu este toxic pentru artropodele terestre care nu sunt vizate (antagoniști). Se descompune ușor în apă și în sol.



KANEMITE

Criminal de eficient în lupta împotriva acarienilor



NISSORUN™
10 WP

ACARICID

Ambalaje: 1 Kg și
20 Kg

NISSORUN 10 WP este un acaricid cu spectru larg de combatere a păianjenilor cu acțiune ovicidă, larvicidă și nimfocidă.

Certificat de omologare nr. 1112 din 28.03.1986

Substanța activă: **Hexitiazox 10%** • Formulare: WP (Pulbere umectabilă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Ardei din spații protejate	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,4 kg/ha
Măr	Acarianul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,3 kg/ha
	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,0 kg/ha
Păr	Acarianul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>)	1 kg/ha
	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	
Viță de vie	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,5 kg/ha
Cireș, piersic, prun, cais	Acarianul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,3 kg/ha
Castraveți (spații protejate, câmp)	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,4 kg/ha
Soia	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,4 kg/ha
Tomate, vinete (spații protejate)	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	1,0 kg/ha
Căpșun (spații protejate, câmp)	Acarianul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>)	1,0 kg/ha
	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	
Pepeni verzi, pepeni galbeni	Acarianul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,8 kg/ha
	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	
Dovleci, dovlecei	Acarianul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>)	0,8 kg/ha
	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	
Plante ornamentale	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus urticae</i>)	0,8 kg/ha

Caracteristici tehnice

NISSORUN 10 WP este un produs cu acțiune sistemic-locală (translaminar) care combate păianjenii de pe ambele fețe ale frunzelor și asigură protecție pentru o perioadă lungă de timp.

- Combate păianjenii în stadiile de ou, larvă, nimfă.
- Protejează culturile împotriva mai multor specii de acarieni.
- Durată lungă de protecție, de peste 40 de zile.
- Nu afectează prădătorii și paraziții naturali ai acarienilor.
- Produs ideal în programele de combatere integrată.

Recomandări de utilizare

- **Pomi fructiferi** - se recomandă să se aplice în special înaintea înfloritului sau în perioada eclozării ouălor de iarnă (sfârșitul lunii aprilie - începutul lunii mai).
- **Viță de vie** - se recomandă în special în perioada de înmugurire și până la sfârșitul înfloritului.
- Pentru evitarea apariției formelor rezistente de acarieni se recomandă aplicarea unui singur tratament în cursul unei perioade de vegetație.
- Se va aplica în alternanță cu alte acaricide.

SANMITE 10 SC este un insecto-acaricid cu acțiune de contact și ingestie, omologat în România pentru combaterea unui spectru larg de dăunători din culturile agricole.

Certificat de omologare nr. 211PC din 20.10.2017

Substanța activă: **Piridaben 100 g/L** • Formulare: SC (Suspensie concentrată)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Culturi protejate din familia solonaceae (tomate, ardei și vinete)	Păianjenul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>), păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus spp.</i>), musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) și musca albă a tutunului (<i>Bemisia tabaci</i>)	Doza 1,5 L/ha – se aplică de la momentul apariției primei inflorescențe până la coacerea deplină (BBCH 51 – 89).
Cucurbitacee în cultura protejată (castraveți)	Păianjenul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>), păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus spp.</i>), musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) și musca albă a tutunului (<i>Bemisia tabaci</i>)	Doza 1,5 L/ha – se aplică de la momentul apariției primei inflorescențe până la coacerea deplină (BBCH 51 – 89).
Plante ornamentale în culturi protejate	Păianjenul roșu (<i>Panonychus ulmi</i>), păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus spp.</i>), musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>) și musca albă a tutunului (<i>Bemisia tabaci</i>)	1,4 L/ha se aplică la infestare
Capsuni, cultura în câmp deschis și spații protejate	Păianjenul roșu comun (<i>Tetranychus spp.</i>), păianjenul căpșunului (<i>Tarsonemus spp.</i>)	Doza 1,5 L/ha – se aplică de la scuturarea petalelor până la a II-a recoltare (BBCH 67 – 89).

Caracteristici tehnice

SANMITE 10 SC este un insecto-acaricid, având substanța activă piridaben 100 g/L. Piridabenul face parte din grupa produselor care stopează transferul de electroni la nivelul 1 al complexului mitocondrial.

Mod de acțiune:

Este un insecto-acaricid non-selectiv, cu acțiune rapidă, de contact („knockdown”) și ingestie. Combate un spectru larg de dăunători din grupele *Acari*, *Aleyrodidae*, *Aphididae*, *Cicadellidae* și *Thysanoptera*. Are efect rapid, de șoc, și activitate reziduală de lungă durată. Acționează la nivelul tuturor stadiilor de dezvoltare, în special la stadiul de larvă și nimfă. Piridabenul are efect și asupra ouălor de insecte, inducând sterilitatea celor care intră în contact cu această substanță.

Recomandări de utilizare

- **SANMITE 10 SC** - în urma utilizării acestui produs nu au fost semnalate cazuri de rezistență încrucișată cu alte acaricide din aceeași grupă chimică.
- **SANMITE 10 SC** este un produs stabil la temperatură și poate fi aplicat, independent de aceasta. NU este fitotoxic utilizat la culturile și în doza omologată.
- Pentru prevenirea fenomenului de rezistență încrucișată, recomandăm utilizarea tratamentelor în alternanță cu alte acaricide din grupe diferite și folosirea instalațiilor de stropit bine reglate pentru cultura pe care este aplicat produsul.

Compatibilitate

SANMITE 10 SC este compatibil cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor utilizate la culturile agricole și poate fi utilizat în amestec „tank-mix”. Pentru a evita apariția posibilelor probleme, vă recomandăm să consultați tabelele de compatibilitate a pesticidelor și să efectuați un test de compatibilitate în prealabil.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



Sanmite
10 SC



Knockdown
dintr-o singură
lovitură

OPTIMOL este un moluscocid unic pe piață datorită formulării umede și modului specific și selectiv de acțiune.

Certificat de omologare nr. 064PC din 29.09.2014
Substanța activă: **Metaldehida 40 g/kg** • Momeli sub formă de granule

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație	Perioada de aplicare
Viță de vie (vin/masă), zmeur, mur, alte fructe mici și de pădure, căpșun	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de înmugurirea plantei, până la stadiul 69 (sfârșitul înfloririi)
		5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de înflorirea plantei, până la stadiul 97 (frunza și tulpina sunt uscate)
Cartof	Limaș și melci	5 kg/ha	La semănat
		5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Sfeclă de zahar, sfeclă furajeră, sfeclă roșie, gulii	Limaș și melci	4 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 41 (începutul îmbobocirii respectiv începutul înfloririi)
		5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 41 (la începutul creșterii plantei; cele două frunze tinere nu se mai deschid)
Conopidă, broccoli, varză, varză de bruxelles	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Salată (alte specii de salată), spanac, specii similare (grășită de iarnă, sfeclă de frunze), ierburi (asmățui, arpagic, țelină de frunze, pătrunjel, salvie, rozmarin, cimbru, busuioc, tarhon) (câmp și sere)	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Mazăre și fasole verde, mazăre și fasole uscată	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 51 (inflorescență vizibilă la frunzele superioare)
Anghinare	Limaș și melci	5 kg/ha	La semănat
Plante oleaginoase (in, mac, susan, floarea-soarelui, rapiță, soia, muștar, dovleac, bumbac, șofrănel, limba mielului, camelină, cânepă, ricin, alte plante oleaginoase cu excepția arahidelor)	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 29 (sfârșitul înfrățirii)
Cereale (grâu, orz, ovăz, secară, triticale)	Limaș și melci	5 kg/ha	Înainte de semănat
Grâu	Limaș și melci	4 kg/ha	



Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație	Perioada de aplicare
Porumb, porumb zaharat	Limaș și melci	4 kg/ha	La semănat
		5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Pajiști noi (raigras)	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat, până la stadiul 15 (5 frunze deschise)
Iarbă de gazon	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 99 (aparitia inactivității vegetative)
Specii ornamentale și flori	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 99 (aparitia inactivității vegetative)
Căpșuni în sere	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de înmugurirea plantei, până la stadiul 69 (sfârșitul înfloririi)
Specii ornamentale și flori în sere	Limaș și melci	5 kg/ha	Cu 7 zile înainte de semănat/plantat, până la stadiul 99 (aparitia inactivității vegetative)

Caracteristici tehnice

- Modul de acțiune este de otrăvire prin ingestie; anestezie și imobilizare; deshidratare prin secreție de mucus în exces.
- Nu afectează fauna utilă (râme, carabide) și conține un repelent pentru păsări.
- Doză ușor de administrat.
- Se descompune în final în CO₂ și apă, nefiind poluant pentru mediul înconjurător.
- Atractanții alimentari și adjuvanții fac acest produs foarte eficient.
- Formularea umedă menține o perioadă lungă de acțiune și nu creează praf.
- Granulele sunt mult mai omogene – 60.000 granule/kg.
- Omologat la un număr mai mare de culturi.

Recomandări de utilizare

- Tratamentele cu **OPTIMOL** se efectuează când apar semne că dăunătorul există în cultură, în principal primăvara și toamna.
- **OPTIMOL** se aplică prin împrăștiere la suprafața solului, manual sau mecanic. Rezultate maxime se obțin la tratamente în condiții de umiditate.
- Dimensiunea omogenă a granulelor îl face potrivit pentru aplicare împreună cu sămânța la semănat.



Noul Optimol
mai eficient la un număr
mai mare de culturi

**Culturi
numai bune
de distrus**

✓ rapiță
✓ varză
✓ salată
✓ cartof
✓ căpșun

OPTIMOL

FUNGICIDE

Buzz Ultra DF	27
Cyflamid 5 EW	28
Cupertine Super	30
Drago 76 WP	31
Fantic M	32
Lieto	33
Syllit 400 SC	34
Topsin 70 WDG	35
Triumf 40 WG	36
Yamato	37

SUMIAGRO

FUNGICIDE



BUZZ ULTRA™ DF

BUZZ ULTRA DF este un fungicid sistemic omologat în România pentru combaterea unui spectru larg de boli din culturile de grâu și rapiță.

Certificat de omologare nr. 345PC din 29.11.2017
Substanța activă: **Tebuconazol 750 g/kg** • Formulare: WG (granule dispersabile în apă)

FUNGICID

Ambalaje: 1 Kg și 10 Kg

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Grâu	Septorioza frunzelor (<i>Septoria tritici</i> ; <i>Septoria nodorum</i>), făinarea cerealelor (<i>Erysiphe graminis</i>), rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>), rugina galbenă (<i>Puccinia striiformis</i>), fuzarioze (<i>Fusarium spp</i>)	Doza 0,33 Kg/Ha
Rapiță	Putregaiul negru (<i>Leptosphaeria maculans</i>), putregaiul alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>)	Doza 0,33 Kg/Ha

Caracteristici tehnice

- Este un fungicid sistemic, condiționat sub formă de granule dispersabile în apă (WG), având consistență omogenă. Nu este oxidant, inflamabil ori exploziv. Produsul are o densitate de 0,52 g/ml, iar pH-ul unei dispersii 1% este de 8,28. Formularea are o bună suspensibilitate, dispersie, spumare și rezistență bună la uzură (rezistență bună a granulelor la spargere/ nu generează praf).
- Este o formulare unică de *tebuconazol*, granulele având o dimensiune medie de 2-4 microni.
- Oferă performanțe superioare în ceea ce privește dimensiunea particulelor și dispersia în soluție și oferă o acoperire excelentă a suprafeței foliare.
- Prezintă caracteristici excelente de rezistență la spulare.

Mod de acțiune

- Este un fungicid care inhibă formarea ergo-sterolului (DMI; Grupul 3 de fungicide). Ca strategie de gestionare a rezistenței, **BUZZ ULTRA DF** poate fi aplicat în tank-mix (cu produse ca ROVER 500 SC) sau alternativ (în orice altă aplicație de pulverizare), cu un fungicid non-DMI ca CYFLAMID 5 EW sau Topsin 70 WDG.
- Este un fungicid sistemic, absorbit prin sistemul foliar și translocat în toate părțile plantei de cultură.
- Este un fungicid multifuncțional, eficient din punct de vedere al costurilor, având rol protectiv, curativ și eradicativ, și controlează un spectru larg de boli din culturile agricole.

Recomandări de utilizare

- Rapiță – **BUZZ ULTRA DF** se aplică pentru combaterea putregaiului negru (*Leptosphaeria maculans*) și putregaiului alb (*Sclerotinia sclerotiorum*), începând cu faza de vegetație de 6-9 frunze până la începutul înfloritului (BBCH 20 – 61).
- Grâu – **Buzz Ultra DF** se aplică în perioada de vegetație, începând cu fenofaza de alungire a paiului, până la sfârșitul înfloritului (BBCH 30 - 69) pentru combaterea agenților care produc următoarele boli: septorioza frunzelor (*Septoria tritici* și *Septoria nodorum*), făinarea cerealelor (*Erysiphe graminis*), rugina brună (*Puccinia recondita*), rugina galbenă (*Puccinia striiformis*) și fuzariozele (*Fusarium spp*).

Pregătirea soluției:

- Se umple rezervorul mașinii de tratat cu ½ din volumul de apă necesar, se adaugă cantitatea de produs necesară pentru suprafața calculată a fi tratată, apoi se adaugă diferența de ½ din totalul volumului de apă. În timpul pregătirii și aplicării soluției, pentru omogenizare completă se va menține agitatorul mașinii în funcțiune.
- Se aplică cu echipamente specifice utilizate în administrarea produselor de protecție a plantelor în culturile de câmp. Volumul de soluție utilizat este cel specific culturii tratate - 200 – 500 L/ha, în funcție de stadiul de dezvoltare a culturii.

Prevenirea apariției rezistenței:

- Pentru evitarea apariției formelor rezistente se vor alterna tratamentele cu produse din alte grupe chimice, cel puțin o dată la fiecare două aplicări succesive cu **BUZZ ULTRA DF**.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



CYFLAMID™
5 EW

FUNGICID

Ambalaj: 1 L

CYFLAMID 5 EW este un fungicid de excepție cu o excelentă acțiune preventivă și curativă, plus o eficiență foarte bună în combaterea făinărilor.

Certificat de omologare nr. 2270 din 27.05.2004
Substanța activă: **Ciflufenamid 5%** • Formulare: EW (Emulsie de ulei în apă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Grâu	Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>)	0,2 L/ha
Viță de vie	Făinare (<i>Uncinula necator</i>)	0,3 L/ha
Măr	Făinare (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,45 L/ha tratament în 1500 L apă

Caracteristici tehnice

- Pătrunderea în plantă se face translaminar, prin frunze. Prezintă o excelentă acțiune preventivă și curativă.
- Condiționarea sub formă de emulsie în apă (EW) face ca produsul să adere mai bine pe suprafața tratată și să fie mai rezistent la spălare de către ploai și apa de irigații.
- Control eficient în combaterea făinărilor la cereale și alte culturi horticoale.
- Reducerea numărului de tratamente comparativ cu fungicidele convenționale datorită eficacității de lungă durată a produsului.

Recomandări de utilizare

- La cerealele păioase, prima aplicare se recomandă a se efectua primăvara timpuriu, când se va folosi **CYFLAMID 5 EW** singur, la doza de 0,2 L/ha pentru prevenirea sau combaterea făinării.
- În vederea lărgirii spectrului de acțiune se recomandă folosirea amestecului **CYFLAMID 5 EW** 0,1 L/ha + TOPSIN 70 WDG 0,75 kg/ha. Acest amestec se va aplica pentru combaterea complexului de boli foliare, ca al doilea tratament al culturii de grâu.
- Este compatibil cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor uzuale, cu excepția celor puternic alcaline, cum ar fi zeama bordelează.


Cuvânt de avertizare: -

Pictograme de pericol:



Cyflamid™ 5 EW

Regele câștigător în lupta contra făinărilor



CUPERTINE™
SUPER

FUNGICID

Ambalaj: 5 Kg

CUPERTINE SUPER este un fungicid local sistemic și de contact destinat combaterii, în principal, a manei.

Certificat de omologare nr. 2195 din 27.03.2003
Substanțe active: **Cimoxanil 3% + Cupru 22,5%** (sub formă de sulfat de cupru) • Formulare: WP (Pulbere umectabilă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Cartof	Mana cartofului (<i>Phytophthora infestans</i>)	3,5 kg/ha
	Alternarioza (<i>Alternaria solani</i>)	
Viță de vie	Mana viței de vie (<i>Plasmopara viticola</i>)	4 kg/ha
Tomate (câmp)	Mana tomatelor (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,35% (3,5 kg/ha)
Tomate, vinete(câmp și spații protejate)	Alternarioza (<i>Alternaria solani</i>)	3,5 kg/ha
Ardei (câmp și spații protejate)	Mana ardeiului (<i>Phytophthora capsica</i>) Alternarioza (<i>Alternaria solani</i>)	3,5 kg/ha

Caracteristici tehnice

- Este o combinație a două substanțe active cu efect complementar în combaterea manei astfel:
- cimoxanil este componentă cu sistemie locală care pătrunde în plantă și acționează din interior;
 - cuprul este un produs de contact care previne și combate mana din exteriorul plantei.
- Împiedică dezvoltarea ciupercilor patogene pe suprafața plantelor și în interiorul acestora.
 - Oprește sporularea și extinderea bolii pe alte plante.
 - Pătrunde rapid în țesutul vegetal și nu este ușor spălat de ploii sau de apa de la irigații.
 - Cuprul sub formă de zeamă bordelează este foarte activ în combaterea mănărilor.
 - Se elimină riscul apariției de rase rezistente ale agenților patogeni combătuți.

Recomandări de utilizare

- Pentru combaterea manei, **CUPERTINE SUPER** este recomandat a se aplica de 2-3 ori pe sezon, în alternanță cu fungicide de contact (ROVER 500 SC, TRIUMF 40 WG, DRAGO 76 WP).
- La cultura cartofului, alternanța fungicidului **CUPERTINE SUPER** cu fungicide de contact asigură o protecție foarte bună atât împotriva manei cât și a alternariozei și împiedică apariția formelor rezistente ale ciupercilor.
- La vița de vie **CUPERTINE SUPER** se recomandă a se aplica în special în perioada de creștere activă a lăstarilor, înflorit și dezvoltarea boabelor. Se va alterna cu fungicide de contact cum ar fi ROVER 500 SC, TRIUMF 40 WG, DRAGO 76 WP.
- La legume, prin componenta sa cuprică, produsul combate și bacteriozele deosebit de periculoase pentru această categorie de culturi.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



DRAGO™
76 WP

FUNGICID

Ambalaje:
1 Kg și 10 Kg

DRAGO 76 WP este un fungicid local sistemic și de contact pentru combaterea mănărilor.

Certificat de omologare nr. 2701 din 11.06.2007
Substanțe active: **Cimoxanil 6% + Mancozeb 70%** • Formulare: WP (Pulbere umectabilă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Viță de vie	Mana viței de vie (<i>Plasmopara viticola</i>)	2 kg/ha (în 1000 L apă)
Tomate (câmp)	Mana tomatelor (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,2% (2 kg/ha)
Cartof	Mana cartofului (<i>Phytophthora infestans</i>) Alternarioză (<i>Alternaria spp.</i>)	2 kg/ha

Caracteristici tehnice

- Fungicid cu sistemie locală și de contact cu efect persistent și acțiune rapidă.
- După aplicare, produsul pătrunde translaminar în plante într-un interval scurt de timp (3-4 ore), reducând astfel riscul spălării.
 - Acționează în două moduri distincte: prin împiedicarea sporulării și blocarea creșterii miceliului ciupercii.
 - Riscul apariției formelor rezistente este foarte scăzut datorită combinației optime de substanțe active ale produsului.
 - Are efect preventiv și curativ.
 - Prezintă acțiune reziduală de scurtă durată fiind descompus în plantă după aproximativ 4-6 zile.

Recomandări de utilizare

- La **cartof** aplicarea tratamentelor trebuie să înceapă când se acoperă spațiul dintre rânduri sau imediat la apariția primelor simptome ale bolii și la avertizare.
- Când condițiile meteo sunt favorabile dezvoltării bolii și presiunea de infecție este mare, se recomandă repetarea tratamentelor la un interval de 7-10 zile.
- La culturile irigate prin aspersie, tratamentele se vor repeta la un interval minim de 7 zile, deoarece riscul apariției infecției este foarte mare. Tratamentul se va aplica după irigarea culturilor.
- La **vița de vie** infecția este stopată în 2-3 zile de la aplicare.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:





FUNGICID

Ambalaj: 5 Kg

FANTIC M WP este un fungicid performant care conține două substanțe active, cu acțiune sistemică și de contact.

Certificat de omologare nr. 2844 din 06.11.2009

Substanțe active: **Benalaxil-M 4% + Mancozeb 65%** • Formulare: WP (Pulbere umectabilă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Viță de vie	Mană (<i>Plasmopara viticola</i>)	2,5 kg/ha Volum apă 1000 L/ha
Cartof	Mană (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 kg/ha Volum apă 600 L/ha
Tomate	Mană (<i>Phytophthora infestans</i>)	2,5 kg/ha Volum apă 600-1000 L/ha
Ceapă	Mană (<i>Peronospora destructor</i>)	2,5 kg/ha Volum apă 300-600 L/ha

Caracteristici tehnice

- **FANTIC M** este un fungicid cu activitate de prevenire și eradicare, având un spectru larg de combatere.
- **Benalaxil**, substanța activă din produsul **FANTIC M**, este componenta sistemică ce se caracterizează prin acțiune preventivă și curativă.
- **Mancozeb** este componenta de contact, cu spectru foarte larg de combatere a ciupercilor patogene.
- **FANTIC M**, prin intermediul celor două substanțe active, are o penetrare rapidă în țesuturile plantei tratate, cât și un transport și distribuție optimă la nivelul întregii plante. O parte a produsului rămâne pe suprafața plantei, formând un rezervor de produs, care este absorbit treptat.
- **FANTIC M** este rezistent la spălare (ploaie ori apa de irigații), după o perioadă de 4-6 ore de la administrare.

Recomandări de utilizare

- Tratamentele cu **FANTIC M** se execută conform strategiei de protecție a plantelor în concordanță cu fișa tehnologică a culturii, în alternanță cu alte fungicide, păstrând un interval de 10-14 zile între tratamente.
- **Viță de vie** - **FANTIC M** este aplicat preventiv, prin stropiri, într-un program de stopare a manei din plantație. Produsul este acceptat în viticultură, nelăsând reziduuri în vin. Primul tratament cu **FANTIC M** este recomandat a fi aplicat preventiv, înainte de începutul înfloriturii, atunci când avem 5-8 frunze mature. În condiții meteo favorabile instalării manei, este recomandată repetarea tratamentului, respectând un timp de pauză de 10 zile între tratamente.
- **Cartof** - produsul se aplică preventiv, imediat ce se constată condițiile de instalare a infecțiilor primare. În cazul instalării manei, este recomandat să aplicăm imediat un tratament cu **FANTIC M**. Tratamentele pot fi repetate, respectând o perioadă de 7-10 zile între tratamente. În condiții climatice favorabile instalării manei, este recomandat să se repete tratamentul la un interval de 7 zile.
- **Ceapă, tomate** - ca și la cultura de cartof, **FANTIC M** se aplică preventiv. Produsul este aplicat imediat, indiferent de fenofaza de vegetație a plantei, dacă există avertizare de atac de mană.
- **FANTIC M** este recomandat a fi aplicat în perioadele de creștere intensă a plantei, înainte de închiderea rândurilor de cartof. Aplicat în această perioadă, putem avea cea mai bună performanță a tratamentelor cu **FANTIC M**.
- **FANTIC M** poate fi aplicat folosind orice echipament de aplicare a pesticidelor existent în dotarea fermierului (purtat ori tractat). Echipamentul trebuie să fie bine reglat, pentru a evita efectul de drift (evitarea ajungerii soluției de stropit pe alte culturi).
- **NU** sunt recomandate mai mult de trei tratamente per perioadă de vegetație.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



FUNGICID

Ambalaje: 1 Kg

LIETO este un fungicid sistemic, unic pe piața din România, condiționat sub formă de granule dispersabile în apă (WG), având culoarea maro și miros specific.

Certificat de omologare nr. 205PC din 20.10.2016

Substanța activă: **Cimoxanil 330 g/kg + Zoxamid 330 g/kg** • Formulare: WG (Granule dispersabile în apă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Cartof	Mana cartofului (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,45 kg/ha
Tomate	Mana tomatelor (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,40 kg/ha
Viță de vie	Mana viței de vie (<i>Plasmopara viticola</i>)	0,40 kg/ha

Caracteristici tehnice

- **LIETO** este un fungicid cu acțiune curativă și preventivă, fiind condiționat sub formă de granule dispersabile în apă (WG). Are în componența sa două substanțe active, cu două mecanisme de acțiune diferite.
- **Cimoxanil** 330 g/kg – substanță activă cu un mecanism de acțiune multisite, sistemică ce este foarte rapid absorbită de aparatul foliar și distribuită omogen în tot corpul plantei. Activitatea *preventivă* este dată de capacitatea cimoxanilului de a distruge sporii de mană, înainte de instalarea infecției. Activitatea *curativă* este dată de capacitatea substanței de a bloca dezvoltarea miceliului în primele 2-3 zile de la instalare. Cantitatea de cimoxanil aplicată este redusă (120 – 150 g/ha), având un impact minim pentru mediul înconjurător și probabilitate scăzută de a genera forme rezistente.
- **Zoxamid** 330 g/kg – substanță activă de contact, cu acțiune preventivă, caracterizată prin capacitatea de distrugere a sporilor de mană înainte ca boala să se instaleze în plantă. Are un mecanism de acțiune multisite; inhibă formarea zoosporilor în sporangie; stopează alungirea tubului germinativ în primele cicluri de diviziune în nucleu, prevenind pătrunderea fungilor în celulele plantei. Pătrunde în plantă foarte rapid (1-2 ore de la aplicare), în sistemul cuticular care acoperă stemul frunzelor și fructelor. Are și efect secundar de combatere a *Botrytis spp.* și *Alternaria spp.*, dar și un profil eco-toxicologic foarte bun.
- **LIETO** este rezistent la spălare (ploi și apă de irigații). Se recomandă alternarea în aplicare cu alte produse de protecție a plantelor, dar nu mai mult de 5 aplicări pe sezon.

Recomandări de utilizare

- Tratamentele cu **LIETO** se execută conform strategiei de protecție a plantelor, stabilită conform fișei tehnologice a fiecărei culturi, în alternanță cu alte fungicide, păstrând un interval de 7-10 zile între tratamente.
- În cultura **cartofului**, produsul **LIETO** poate fi aplicat pe toată perioada de vegetație, începând cu fenofaza de 3-4 frunze adevărate, până la maturarea fructificațiilor (înegrirea semințelor din bacă). Recomandarea Summit Agro este să aplicați produsul **LIETO** începând cu 3-4 etaje de frunze formate, până la maturarea fructelor. Pentru primele 2 tratamente recomandăm să aplicați **LIETO** singur, iar următoarele 2-3 tratamente în tank-mix cu alte produse (ex. Fluazinam, cyazofamid).
- În cultura de **tomate**, produsul **LIETO** poate fi aplicat începând cu fenofaza de 3-4 frunze adevărate, până la fenofaza de coacere a fructificațiilor. Recomandarea Summit Agro este de a începe tratamentul cu **LIETO** începând cu fenofaza de formare a bobocilor floralii, până la coacerea completă a fructelor. Ca și în cazul culturii de cartof, recomandăm maximum 5 tratamente per perioadă de vegetație, cu un interval de 7-10 zile între tratamente.
- În cultura **viței de vie**, produsul **LIETO** poate fi utilizat începând cu fenofaza de 3-4 frunze adevărate, până la coacerea fructificațiilor. Recomandarea Summit Agro este să folosiți produsul **LIETO** începând cu fenofaza de scuturare completă a florilor, până la intrarea în părgă a fructificațiilor. **LIETO** are efect și în combaterea scoriozei și a putregaiului negru și are efect secundar și în combaterea putregaiului cenușiu. Numărul maxim de tratamente per perioadă de vegetație este de 5, respectând un interval de 7-10 zile între tratamente.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



SYLLIT™
400 SC

FUNGICID

Ambalaje: 1 L și 5 L

SYLLIT 400 SC este un fungicid utilizat în pomicultură pentru combaterea rapănului și a altor boli.

Certificat de omologare nr. 2154 din 11.10.2002
Substanța activă: **Dodine 400 g/L** • Formulare: SC (Suspensie concentrată)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Măr	Rapăn (<i>Venturia inaequalis</i>)	0,13% (1,95 L/ha)
Piersic	Deformarea frunzelor de piersic (<i>Taphrina deformans</i>)	0,2% (2,0 L/ha)
Prun	Pătarea roșie a frunzelor de prun (<i>Polystigma rubrum</i>)	0,13% (1,3 L/ha)

Caracteristici tehnice

- Fungicid cu efect preventiv excelent și curativ de lungă durată; antișporulant și antigerminativ.
- Penetrează rapid frunzele, fiind rezistent la ploile ce pot surveni după efectuarea tratamentului.
- **SYLLIT** acționează ca un “detergent”, îndepărtând lipidele din pereții celulari ai ciupercilor patogene. Acest mod de acțiune unic îi conferă avantajul de a fi un partener foarte bun în orice program integrat de tratamente, care își propune să mențină eficacitatea produselor din alte grupe chimice.
- Pentru efect curativ maxim, trebuie aplicat cel târziu la 48 de ore de la apariția infecției.
- Performanța sa este ridicată și la temperaturi scăzute. Se recomandă însă, ca la aplicare, temperatura aerului să fie de minimum 6° C, pentru ca și metabolismul pomilor să fie optim.
- Poate fi folosit și pe foliaj umed.

Recomandări de utilizare

- **Măr** - **SYLLIT** se recomandă în special pentru primele două tratamente împotriva rapănului – primul la începutul dezmuguririi, iar următorul la 7 zile.
- **Piersic** - pentru combaterea bășicării frunzelor **SYLLIT** se aplică toamna târziu când 80% din frunze sunt căzute și primăvara la începutul înfrunzirii. Un alt tratament se va aplica în perioada cuprinsă între stadiul de boboc floral până la căderea petalelor.
- **Prun** - pentru prevenirea pătării roșii a frunzelor, se recomandă aplicarea **SYLLIT** astfel: la căderea petalelor; la 2-3 săptămâni înainte de recoltare; imediat după recoltare.

Cuvânt de avertizare: **PERICOL**

Pictograme de pericol:



TOPSIN™
70 WDG

FUNGICID

Ambalaje: 1 Kg și 20 Kg

TOPSIN 70 WDG este un fungicid sistemic cu o excelentă acțiune preventivă și curativă.

Certificat de omologare nr. 2713 din 25.10.2007
Substanța activă: **Tiofanat - metil 700g/Kg** • Formulare: WDG (Granule dispersabile în apă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Orz	Boli foliare: Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>), pătarea reticulară (<i>Pyrenophora teres</i>), arsura frunzelor (<i>Rhynchosporium secalis</i>), sfâșierea frunzelor (<i>Helminthosporium sativum</i>)	1 kg/ha
Floarea-soarelui	Putregai alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), putregai cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>), pătarea brună sau frângerea tulpinii (<i>Phomopsis helianthi</i>), alternarioză (<i>Alternaria spp.</i>)	1 kg/ha (2 tratamente în vegetație)
Rapiță	Putregai negru (<i>Phoma lingam</i>), putregai alb (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), putregai cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>), Alternarioză (<i>Alternaria brassicae</i>), făinare (<i>Erysiphe communis</i>)	1 kg/ha (aplicat în vegetație)
Viță de vie	Făinare (<i>Uncinula necator</i>)	1 kg/ha
Tomate	Pătarea cafenie (<i>Fulvia fulva</i>) Fuzarioză (<i>Fusarium oxysporum</i>)	0,1% (1 kg/ha) în 1000 L apă 0,05 - 0,10%
Castraveți	Fuzarioză (<i>Fusarium oxysporum</i>), verticilioză (<i>Verticillium dahliae</i>)	0,05 - 0,10% (1 L/plantă)
Ardei, vinete	Verticilioză (<i>Verticillium dahliae</i>)	0,05 - 0,10% (0,5 L/plantă)
Grâu	Boli foliare și ale spicului: Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>), rugină (<i>Puccinia spp.</i>), septorioză (<i>Septoria spp.</i>), fuzarioză (<i>Fusarium spp.</i>), sfâșierea frunzelor (<i>Helminthosporium sativum</i>)	1 kg/ha
Căpșun	Putregai cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>) Putregai alb (<i>Mycosphaerella fragariae</i>)	0,07% (0,7 kg/ha în 1000 L apă)
Prun	Pătarea roșie (<i>Polystigma rubrum</i>) Monilioza (<i>Monilinia spp.</i>)	0,07% (0,7 kg/ha) în 1000 L apă
Piersic	Deformarea frunzelor (<i>Taphrina deformans</i>) Monilioza (<i>Monilinia spp.</i>)	0,07% (0,7 kg/ha) în 1000 L apă
Cireș	Pătarea frunzelor (<i>Blumeriella jaapi</i>) Monilioza (<i>Monilinia spp.</i>)	0,07% (0,7 kg/ha) în 1000 L apă
Măr	Rapăn (<i>Venturia inaequalis</i>) Făinarea (<i>Podosphaera leucotricha</i>)	0,07% (1,050 kg/ha) în 1500 L apă

Caracteristici tehnice

- Are un spectru larg de acțiune, asigurând combaterea cu succes a făinărilor, putregaiurilor umede și uscate, a rapănului și pătării frunzelor din principalele culturi.
- Este compatibil în amestec cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor, cu excepția celor alcaline (ex: zeamă bordeleză).
- Nu prezintă fitotoxicitate la dozele recomandate.
- Are eficacitate pe o perioadă îndelungată.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



TRIUMF™
40 WG

FUNGICID

Ambalaj: 1 Kg și 15 Kg



TRIUMF 40 WG este un fungicid de contact pentru combaterea mănărilor, bacteriozelor și altor boli fitopatogene ale plantelor.

Certificat de omologare nr. 2752 din 27.03.2008
Substanța activă: 40% cupru metalic sub formă de hidroxid de cupru • Formulare: WG (Granule dispersabile în apă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Cartof	Mana cartofului (<i>Phytophthora infestans</i>)	3,75 kg/ha
Tomate	Mana tomatelor (<i>Phytophthora infestans</i>)	0,375% (3,75 kg/ha)
Viță de vie	Mana viței de vie (<i>Plasmopara viticola</i>)	2,5 kg/ha în 1000 L apă
Măr	Focul bacterian al rosaceelor (<i>Erwinia amylovora</i>)	0,25% (3,750 kg/ha/1500 L apă)
Păr	Focul bacterian al rosaceelor (<i>Erwinia amylovora</i>)	2,5 kg/ha/1000 L apă

Caracteristici tehnice

- TRIUMF 40 WG este un fungicid de contact pe bază de cupru cu acțiune multi-site asupra agenților patogeni.
- Are efect preventiv și protector asupra culturilor pe o perioadă de timp de 7-10 zile de la aplicare.
- Datorită acțiunii sale multiple nu creează forme rezistente, de aceea nu trebuie să lipsească din programele de combatere integrată.
- Formulare granulată foarte performantă și sigură în utilizare pentru operator.
- Solubilitate foarte bună.
- Produsul nu este fitotoxic la dozele recomandate.

Recomandări de utilizare

- **Cartof** - se recomandă aplicarea în vegetație a 2-3 tratamente. Primul tratament se aplică la 14 zile după acoperirea intervalului dintre rânduri și ultimul când frunzele încep să se îngălbenească.
- **Măr, păr** - intervalul de aplicare este cuprins între formarea urechiușelor de șoarece și până când 50% din frunze s-au îngălbenit.
- **Pomi fructiferi** - se aplică primăvara devreme la ieșirea din repausul vegetativ pentru combaterea formelor hibernante ale agenților patogeni. De asemenea, se recomandă toamna la căderea frunzelor, pentru diminuarea rezervei de forme rezistente și menținerea igienei culturii.
- **Viță de vie** - se aplică pe toată perioada de vegetație. Aplicarea din primăvară poate preveni daunele provocate de brume sau înghețuri târzii. Aplicat toamna, la căderea frunzelor, crește rezistența la îngheț și ajută la maturarea mai bună a coardelor.
- **Tomate** - se aplică pe toată durata perioadei de vegetație, inclusiv la răsaduri, unde are și rol de dezinfectant al substratului.

TRIUMF 40 WG previne și combate formele rezistente create de fungicidele sistemice. Pentru combaterea mănărilor se recomandă folosirea în alternanță sau în combinație cu produse sistemice pe bază de: cimoxanil, metalaxil, dimetomorf etc.

TRIUMF 40 WG este compatibil în amestec cu majoritatea insecticidelor și fungicidelor utilizate în protecția plantelor.

Pentru alte combinații se recomandă efectuarea testelor de compatibilitate fizico-chimică.

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE

Pictograme de pericol:



YAMATO®

FUNGICID

Ambalaj: 5 L



YAMATO este un fungicid sistemic cu acțiune preventivă și curativă împotriva unui spectru larg de agenți patogeni din culturile de grâu.

Certificat de omologare nr. 2779 din 26.06.2008
Substanțe active: Tiofanat-metil 233 g/L + Tetraconazol 70 g/L • Formulare: SE (Suspoemulsie)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Grâu	Complex de boli foliare și ale spicului: pătarea brună a spicelor (<i>Septoria nodorum</i>), pătarea brună a frunzelor (<i>Septoria tritici</i>), făinare (<i>Erysiphe graminis</i>), rugina brună (<i>Puccinia recondita</i>), rugina galbenă (<i>Puccinia striiformis</i>), pătarea în ochi a bazei tulpinii (<i>Pseudocercospora herpotrichoides</i>), helmintosporioză (<i>Drechslera tritici-repentis</i>), Fuzarioză (<i>Fusarium spp.</i>)	1,5 L/ha (BBCH 30-59)
Orz	Făinare (<i>Erysiphe graminis</i>), pătarea reticulară (<i>Pyrenophora teres</i>), arsura frunzelor de orz (<i>Rhynchosporium secalis</i>)	1,75 L/ha (BBCH 30-59)
Rapiță	Putregaiul alb al tulpinilor (<i>Sclerotinia sclerotiorum</i>), alternarioza rapiței (<i>Alternaria brassicae</i>), putregaiul tulpinilor (<i>Leptosphaeria maculans</i>), putregaiul cenușiu (<i>Botrytis cinerea</i>)	1,75 L/ha Primul tratament se aplică la apariția primelor 4-6 frunze (BBCH 14 - 16) Al II-lea tratament se aplică de la stadiul de rozetă până la 3 internoduri vizibile (BBCH 30 - 33) Al III-lea tratament se aplică de la stadiul de buton galben până la sfârșitul înfloririi (BBCH 59 - 69)
Sfeclă de zahăr	Făinare (<i>Erysiphe betae</i>), cercosporioza (<i>Cercospora beticola</i>), ramularia (<i>Ramularia beticola</i>)	1,5 L/ha (BBCH 37-47) După apariția simptomelor

Caracteristici tehnice

- Combinație între două substanțe active cu moduri diferite de acțiune și cu efect sinergic.
- Tiofanat metil este un benzimidazol sistemic, fiind absorbit prin frunze, apoi translocat acropetal în toate țesuturile plantei. Inhibă dezvoltarea ciupercilor patogene, penetrarea lor în plantă precum și creșterea miceliului.
- Tetraconazol face parte din grupa triazoloilor și este ușor absorbit și translocat. Oferă plantei o protecție de lungă durată, având, de asemenea, și efecte curative.
- Recomandat în programele de management și combatere a formelor rezistente ale patogenilor.
- Are eficacitate pe o perioadă lungă de timp.

Recomandări de utilizare

- La cereale, YAMATO se recomandă a fi aplicat împotriva bolilor criptogamice ale tulpinii, frunzelor și spicului. Se aplică unul sau două, tratamente în, funcție de condițiile de infecție. Acțiunea produsului se desfășoară pe o perioadă de 3-4 săptămâni.
- Primul tratament se va aplica odată cu erbicidarea, iar al doilea la 3-4 săptămâni (înspicare).

Cuvânt de avertizare: ATENȚIE

Pictograme de pericol:



TARGA SUPER 5 EC

Galbenul absolut.
Nicio buruiană în sola mea.



Sola în toamnă

Sola în primăvară

ERBICIDE

Arbiter
Assault 
Barracuda
Click Pro 
Lancelot Super
Nisshin 4 SC
Pledge 50 WP
Targa Super 5 EC

42
44
45
46
50
41
49
53



ERBICIDE



Același luptător,
neînvins în lupta cu buruienile!



NISSHIN 4 SC este un erbicid post-emergent pentru combaterea buruienilor graminee anuale și perene și a unor dicotiledonate în cultura porumbului.

Certificat de omologare nr. 1321 din 13.03.1992

Substanța activă: **Nicosulfuron 40 g/L** • Formulare: SC (Suspensie concentrată)

ERBICID

Ambalaje: 1 L și 5 L

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
	Costreiu din rizomi (în funcție de gradul de infestare)	1-1,5 L/ha
Porumb	Burieni monocotiledonate anuale: Mohor (<i>Setaria spp.</i>), iarba bărboasă (<i>Echinochloa spp.</i>), costrei din sămânță (<i>Sorghum spp.</i>)	0,8 L/ha postemergent (4-6 frunze la porumb; 2-4 frunzițe înainte de înfrățire la burieni monocotiledonate anuale)
	Costreiu din rizomi	0,75 L/ha+0,5 L/ha tratament secvențial (primul tratament se aplică "postemergent timpuriu", când plantele de porumb au 3-4 frunze și costreiu < 15 cm înălțime, iar al doilea tratament la reinfestare după 2-3 săptămâni)

Caracteristici tehnice

- **NISSHIN 4 SC** este rapid absorbit de frunze și într-o mică măsură de rădăcini, fiind apoi translocat prin xylem și phloem.
- Este o suspensie concentrată pe bază de ulei vegetal, are o formulare cu o foarte bună stabilitate în timp și cu un excelent profil de mediu.
- Conține un adjuvant care asigură o bună absorbție și rezistență la spălare.
- Se folosește o doză redusă de substanță activă (nicosulfuron) la hectar de la 30 la 60 g/ha.
- Flexibilitate în aplicare de la 2 la 8 frunze ale porumbului.
- Excelentă selectivitate pentru porumb până la 120 g s.a/ha, putând fi folosit și în loturile de hibridare.

Recomandări de utilizare

- Se va aplica atunci când buruienile graminee anuale sunt în faza de 1-3 frunze, până la înfrățit, iar pentru costreiu din rizomi la 15-25 cm înălțime. Rezultate foarte bune la costreiu din rizomi, mai ales la infestări medii se obțin aplicând 1,25 L/ha. Pentru infestări puternice și atunci când s-a depășit faza optimă se va aplica doza maximă de 1,5 L/ha.
- La aplicarea secvențială, primul tratament se aplică atunci când porumbul are 2-4 frunze și costreiu până în 15 cm, iar al doilea la 2-3 săptămâni.
- Pentru lărgirea spectrului de combatere a dicotilelor se poate face un tank-mix cu alte produse specifice.

Nu se recomandă a se aplica:

- În condiții de temperatură scăzută - ideal ar fi la 12-25°C;
- La plantele de porumb aflate în stres sau bolnave;
- În condiții de secetă extremă;
- În condiții de secetă se poate amesteca cu adjuvantul Spur sau Toil pentru a spori preluarea și absorbția.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



ARBITER este un erbicid postemergent sistemic, utilizat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene din culturile de cereale păioase, porumb și pășuni.

Certificat de omologare nr. 039PC din 27.02.2014
Substanța activă: Fluroxipir 200 g/L • Formulare: EC (Concentrat emulsiabil)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Grâu și orz - cultura de toamnă	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	1,0 L/ha (aplicare postemergentă începând cu faza de 3 frunze până în faza de 2 internoduri formate)
Ovăz - cultura de toamnă; Secară	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	1,0 L/ha (aplicare postemergentă începând cu faza de 3-4 frunze formate până înainte de al II-lea internod)
Porumb pentru furaj	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	1,0 L/ha (aplicare postemergentă începând cu faza de 3-6 frunze până la primul nod)
Pășuni	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	1,0 L/ha (pentru pășunile permanente doza aplicată ca tratament anual nu va depăși 30 ml în 10 L apă)

Caracteristici tehnice

- ARBITER este un erbicid selectiv pentru culturile agricole pentru care a fost omologat (cereale păioase semănate toamna și primăvara; porumb pentru furaj și pășuni nou însămânțate și mai vechi de 1 an).
- Produsul este absorbit prin aparatul foliar și translocat rapid în întreaga plantă. Efectul erbicidului poate fi observat la 7-10 zile de la aplicare, când buruienile sunt oprite din dezvoltare, au culoarea verde deschis până la galben, culminând cu distrugerea totală.
- ARBITER este un erbicid care conține Fluroxipir 200 g/L, una dintre cele mai eficiente soluții pentru combaterea turiței (*Galium aparine*) din culturile de cereale păioase și pajiști.

Recomandări de utilizare

- ARBITER se aplică atunci când buruienile țină sunt în stadiul de dezvoltare de cel puțin o pereche de frunze adevărate. Soluția aplicată trebuie să acopere complet întreg aparatul foliar al buruienilor, astfel încât efectul erbicidului să fie maxim.
- Pentru combaterea buruienilor din culturile de cereale păioase de toamnă, recomandăm începerea tratamentului cu ARBITER, atunci când planta de cultură este în stadiul de 3 frunze formate, până înainte de formarea celui de-al treilea nod. Doza recomandată este de 1 L/ha într-un volum de apă de 250-300 L (în funcție de mașina de erbicidată utilizată).
- Aplicat în post-emergență la cultura de porumb, până la fenofaza de 6 frunze, ARBITER combate foarte bine buruienile cu frunză lată cum ar fi: *Convolvulus arvensis* (volbura), *Solanum nigrum* (zârna), samulastra de floarea-soarelui, *Portulaca oleracea* (iarba grasă), *Datura stramonium* (ciumăfaia).
- NU este fito-toxic pentru culturile la care a fost omologat.

Cuvânt de avertizare: PERICOL

Pictograme de pericol:



- Pentru o combatere cât mai eficientă și pentru a avea o cultură curată de buruieni, ARBITER poate fi aplicat în tank-mix cu alte erbicide, inclusiv sulfonilureice (DMA 6, Esteron Extra 600 EC, Lontrel 300). Înainte de utilizare este necesară consultarea tabelelor de compatibilitate și efectuarea unui test practic.
- La culturile de cereale păioase de primăvară, recomandăm aplicarea produsului ARBITER începând cu stadiul de 2 frunze al culturii și până la apariția celui de al II-lea internod. Doza recomandată este de 0,75 L/ha.
- Rezultate maxime se obțin atunci când produsul este aplicat în faza de creștere activă a buruienilor, iar planta de cultură nu depășește stadiul de dezvoltare menționat în tabelul de utilizare.
- Nu se aplică la culturile afectate de secetă ori foarte turgescente (plante care au un conținut de apă mult mai mare decât normal).
- Combaterea buruienilor din pășuni nou semănate se face la începutul toamnei, când iarba este bine dezvoltată și buruienile sunt în creștere. Doza recomandată este de 0,75 L/ha.
- La pășuni permanente doza recomandată este de 1,25 L/ha în 300-400 L apă primăvara, atunci când buruienile sunt în faza de rozetă. Poate fi folosit și la 14-21 zile după cosire, când frunzele buruienilor au crescut din nou. Tratamentul poate fi repetat și în anul următor.
- NU se execută lucrări mecanice în primele 7 zile de la tratament.
- Aplicarea erbicidului ARBITER, NU este recomandat a fi făcută pe pășuni care au în amestec trifoi sau alte plante furajere din familia leguminoase.
- NU SE FOLOSEȘTE ÎN CULTURI DESTINATE PRODUCȚIEI DE SEMINȚE.
- RECOMANDĂM să evitați devierile de pulverizare/driftul. NU tratați în condiții de vânt sau în apropierea altor culturi care pot fi afectate sau distruse.



NOU!

ASSAULT®

ERBICID

Ambalaje: 5 L

ASSAULT este un erbicid selectiv pentru combaterea buruienilor cu frunză lată din culturile agricole.

Certificat de omologare Nr. 283PC din 28.02.2017
Substanța activă: **Dicamba 480 g/L** • Formulare: EC (Emulsie concentrată)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Doza 0,6 L/Ha – aplicat atunci când planta de cultură are 2-6 frunze, iar buruienile sunt în faza de rozetă (2-4 frunze, rozeta având 5 cm diametru). Pentru combaterea volburei (<i>Convolvulus arvensis</i>) se aplică atunci când buruiana are 5-15 cm lungime, iar pentru combaterea pălămei (<i>Cirsium arvense</i>) se aplică atunci când rozeta are 10 cm diametru.
Sorg	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	Doza 0,6 L/Ha – aplicat atunci când planta de cultură are 2-6 frunze, iar buruienile sunt în faza de rozetă (2-4 frunze, rozeta având 5 cm diametru). Pentru combaterea volburei (<i>Convolvulus arvensis</i>) se aplică atunci când buruiana are 5-15 cm lungime, iar pentru combaterea pălămei (<i>Cirsium arvense</i>) se aplică atunci când rozeta are 10 cm diametru.

Caracteristici tehnice

- ASSAULT este un erbicid condiționat sub formă de emulsie concentrată, având substanța activă dicamba 480 g/L. Dicamba face parte din familia acidului benzoic, similar ca și structură și mod de acțiune ca erbicidele din grupa „phenoxy” cum este și 2,4 D.

Mod de acțiune

- Este un erbicid selectiv, care este absorbit de plantă prin frunze și rădăcină, având o translocare foarte rapidă în plantă (acropetal și bazipetal). Ca și erbicidele din grupa „phenoxy”, dicamba imită auxinele, un tip de hormon al plantelor, și provoacă o creștere anormală prin afectarea diviziunii celulare.

Recomandări de utilizare

- ASSAULT este omologat pentru combaterea buruienilor cu frunză lată, anuale și perene, din cultura de porumb și sorg. Recomandăm aplicarea produsului atunci când plantele de porumb sunt în fenofaza de 2 frunze, dar nu mai târziu de fenofaza de 6 frunze, iar buruienile sunt în faza de rozetă. Volumul de apă recomandat este de 200 – 400 L apă la hectar. Aplicarea cu întârziere poate conduce la diminuarea eficienței produsului. Se va aplica un singur tratament pe sezon.

Nu se va aplica la culturile slab dezvoltate sau afectate de diferiți factori și nici pe cele umezite de ploaie sau rouă. De asemenea, nu se va aplica la loturile pentru producere de sămânță și la porumbul dulce. Se va evita aplicarea la temperaturi mai mari de 28°C, temperatura optimă de aplicare fiind de 10-25°C sau dacă este prognozată o scădere a temperaturilor peste noapte de până la 5°C. Fitotoxicitatea la porumb poate apărea dacă aplicarea se face în afara perioadei recomandate și simptomele sunt tipice erbicidelor auxinice (frunze îngălbenite, stagnarea creșterii, îndoirea tulpinilor). De asemenea, pot apărea simptome trecătoare și la o aplicare în fenofaza optimă, când urmează o perioadă cu temperaturi scăzute după tratament.

Compatibilitate

- ASSAULT este compatibil cu majoritatea produselor pentru protecția plantelor utilizate la culturile de porumb și sorg și poate fi utilizat în amestec „tank-mix”. Înainte de a genera un amestec de produse pentru protecția plantelor, vă recomandăm să consultați tabelele de compatibilitate ale acestora și să efectuați un test.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



BARRACUDA

ERBICID

Ambalaje: 5 L

BARRACUDA este un erbicid cu acțiune sistemică, omologat în România pentru combaterea unui spectru larg de buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale din cultura de porumb.

Certificat de omologare nr. 267PC din 19.12.2016
Substanța activă: **Mesotrione 100 g/L** • Formulare: SC (Suspensie concentrată)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Porumb boabe și porumb pentru siloz	Buruieni monocotiledonate și dicotiledonate anuale	Doza 0,75 – 1,5 L/ha – se aplică de la atunci când plantele de porumb au 2 – 8 frunze (BBCH 12 – 18)

Caracteristici tehnice

- BARRACUDA este un erbicid sistemic, condiționat sub formă de suspensie concentrată omogenă, de culoare crem închis și cu miros specific.
- Substanța activă mesotrione 100 g/L este sintetizată chimic și este o copie a unui produs natural ce combate buruienile, substanță numită leptospermone.

Mod de acțiune:

- Acționează prin inhibarea enzimei 4-hydroxyphenylpyruvate dioxygenaze (HPPD), enzimă importantă în procesul de biosinteză a carotenoidelor. Fără carotenoide, clorofila este distrusă de lumina solară și duce la moartea plantelor sensibile / buruienilor din cultura de porumb. Este singura substanță activă / erbicid cu un astfel de mod de acțiune asupra plantelor sensibile.
- Este un erbicid ce poate fi aplicat preemergent cât și postemergent, selectiv pentru cultura de porumb, având rol de combatere a buruienilor cu frunză lată, cât și a unor graminee din culturile agricole. Produsul este preluat de plantă prin frunze și rădăcini și translocat în plantă acropetal, dar și bazipetal. La aplicarea preemergentă, produsul este absorbit de rădăcinile abia formate, iar în cazul aplicării postemergente produsul este absorbit prin sistemul foliar al plantelor. BARRACUDA este un erbicid ce poate fi administrat în combinație cu alte erbicide preemergente pentru a mări spectrul de buruieni combătute din cultura de porumb.
- Având substanță activă unică – mesotrione 100 g/L, ajută la controlul ținut al buruienilor în caz de răsărire eşalonată.
- Buruieni combătute de BARRACUDA: *Xanthium strumarium*, *Ambrosia tifida*, *Abutilon theophrasti*, *Chenopodium spp.*, *Amaranthus spp.*, *Polygonum spp.*
- Combate și unele graminee anuale.

Pregătirea soluției

- Înainte de folosire, recomandăm să agitați bine ambalajul produsului.
- Se umple rezervorul mașinii de tratat cu ½ din volumul de apă necesar, se adaugă cantitatea de produs necesară pentru suprafața calculată a fi tratată, apoi se adaugă diferența de ½ din totalul volumului de apă. În timpul pregătirii și aplicării soluției, pentru omogenizare completă, se va menține agitatorul mașinii în funcțiune.
- Se aplică cu echipamente specifice utilizate în administrarea produselor de protecție a plantelor în culturile de câmp. Volumul de soluție utilizat este cel specific culturii și stadiului de dezvoltare a culturii și buruienilor din cultura de porumb, 200 – 300 L/Ha.

Prevenirea apariției rezistenței

- Pentru evitarea apariției formelor rezistente se vor alterna tratamentele cu produse din alte grupe chimice, cel puțin o dată la fiecare două aplicări succesive cu BARRACUDA.

Cuvânt de avertizare: **PERICOL**

Pictograme de pericol:



Click Pro

NOU!

ERBICID

Ambalaje: 5 L

CLICK PRO este un erbicid cu acțiune peliculară și sistemică, pentru combaterea buruienilor dicotiledonate și a unor monocotiledonate anuale din cultura de porumb.

Certificat de omologare nr. Nr. 336PC/28.08.2017 • Substanța activă: **50 g/L Mesotrione (4,5% g/g)**
326 g/L Terbutilazin (29,3% g/g) • Formulare: EC (Suspensie concentrată)

ERBICID

Cultura	Spectrul de combatere	Doza	Perioada de aplicare
Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale	2,0 - 2,3 L/ha	Porumb: se aplică preemergent și postemergent până la stadiul de 8 frunze (BBCH 00-18). Buruieni: pentru monocotiledonate se aplică după răsărire, până la înfrățire.

Caracteristici tehnice

- **CLICK PRO** este un erbicid ce conține două substanțe active, asigurând un spectru larg de combatere împotriva principalelor buruieni întâlnite în cultura porumbului precum și o foarte bună fereastră de aplicare. **Terbutilazin** face parte din grupa triazinelor și este preluat de plante prin rădăcini și frunze, apoi este translocat prin xilem, iar substanța activă **Mesotrione** face parte din grupa triketonelor, fiind o substanță cu acțiune sistemică ce este absorbită prin rădăcină, tulpină și frunze, apoi este translocată rapid în întreaga plantă prin xilem și floem.

Mod de acțiune

- **CLICK PRO** este un erbicid ce conține două substanțe active, asigurând un spectru larg de combatere împotriva principalelor buruieni întâlnite în cultura porumbului, precum și o foarte bună fereastră de aplicare. Substanța activă **Terbutilazin** este preluată de buruieni prin rădăcini și frunze, apoi este translocată prin xilem în plantă, acumulându-se în vârfurile de creștere și frunzele acestora. Țesuturile se îngălbenesc, apoi se necrozează. Substanța activă **Mesotrione** are acțiune sistemică, fiind absorbită prin rădăcină, tulpină și frunze și translocată rapid în întreaga plantă prin xilem și floem. Acționează prin inhibarea enzimei HPPD, având acțiune directă în procesul de biosinteză a carotenoidei din buruienile tratate. Acționează direct în procesul de fotosinteză, clorofila fiind distrusă foto-oxidant, ceea ce duce la fenomenul de albire a buruienilor sensibile

Recomandări de utilizare

- **CLICK PRO** este un erbicid cu dublă acțiune, peliculară și sistemică. Poate fi aplicat atât preemergent, cât și postemergent pentru controlul buruienilor dicotiledonate anuale și unele monocotiledonate anuale. Aplicat în postemergență, produsul asigură un bun control al principalelor buruieni monocotiledonate anuale: *Echinochloa crus-galli*, *Digitaria sanguinalis*, *Setaria spp.* și speciile de *Panicum miliaceum*. Pentru a realiza controlul buruienilor mai sus menționate, recomandăm ca aplicarea să se facă până la stadiul de înfrățire al buruienilor țintă. **CLICK PRO** se poate aplica postemergent până la stadiul de dezvoltare de 8 frunze al plantei de porumb. Atunci când sola este îmburuienată predominant cu buruieni termofile (cu răsărire târzie, ex.: *Helianthus annuus*, *Abutilon theophrasti*, *Solanum nigrum*), recomandăm aplicarea produsului în postemergență. Doza aplicată se stabilește în funcție de gradul de îmburuienare și stadiul de dezvoltare a buruienilor cât și în funcție de amestecul în tank-mix cu alte produse. Pentru a avea un control bun al buruienilor monocotiledonate perene, recomandăm asocierea **CLICK PRO** cu un graminicid. La o îmburuienare ridicată, doza recomandată este de 2,3 L/ha, iar în tank-mix se poate utiliza doza de 2 L/ha. Produsul are o largă fereastră de aplicare, pornind din preemergență până în postemergență (stadiul de 8 frunze al culturii de porumb) cu o eficacitate sporită în postemergență. Prin amestecul celor două substanțe active, produsul poate fi utilizat cu succes în programul tehnologic de erbicidare, reducând riscul apariției formelor de rezistență la erbicide. **CLICK PRO** este recomandat a fi utilizat la porumb ca parte a programului de erbicidare, aplicat singur sau în tank-mix cu alte erbicide cu mod de acțiune diferit, având ca scop realizarea unui control eficient și a unui spectru larg de buruieni. Se aplică doar 1 tratament pe sezon pe aceeași sola.

Click Pro

ERBICID

ERBICID

Compatibilitate

- Pentru o folosire corectă, înainte de utilizare, consultați tabelele cu compatibilități și efectuați un test pe cultura respectivă

Spectrul de buruieni combatute

Spectrul de combatere	Preemergent	Postemergent timpuriu	Postemergent
	2-2,3 L/Ha	2-2,3 L/Ha	2-2,3 L/Ha
Teișor (<i>Abutilon theophrasti</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Știr (<i>Amaranthus spp.</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Ambrozie (<i>Ambrosia artemisiifolia</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Spanac sălbatic (<i>Chenopodium album</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Spanac porcesc (<i>Chenopodium hybridum</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Pălămidă (<i>Cirsium arvense</i>)	-	Sensibilă	Sensibilă
Volbură (<i>Convolvulus arvensis</i>)	-	Sensibilă	Sensibilă
Ciumăfaie (<i>Datura stramonium</i>)	-	Sensibilă	Sensibilă
Meișor (<i>Digitaria sanguinalis</i>)	-	Sensibilă	Sensibilă
Iarba bărboasă (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Samulastră de floarea-soarelui (<i>Helianthus annuus</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Zămoșită (<i>Hibiscus trionum</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Mușețel sălbatic (<i>Matricaria inodora L.</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Mei (<i>Panicum miliaceum</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Mohor (<i>Setaria pumila</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Mohor (<i>Setaria verticillata</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Mohor (<i>Setaria viridis</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Muștar sălbatic (<i>Sinapis arvensis</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Zarnă (<i>Solanum nigrum</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă
Cornuț (<i>Xanthium strumarium</i>)	Sensibilă	Sensibilă	Sensibilă

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:

47



ERBICID COMPLET PENTRU PORUMB



PLEDGE®
50 WP

ERBICID

PLEDGE 50 WP este un erbicid utilizat pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și a unor specii monocotiledonate.

Certificat de omologare nr. 2621 din 02.03.2006
Substanța activă: **Flumioxazin 50%** • Formulare: WP (Pulbere umectabilă)

Ambalaj: 400 g x 2

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Solanum nigrum</i> , <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Sinapis arvensis</i> , <i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Atriplex patula</i> , <i>Polygonum aviculare</i> , <i>P. convolvulus</i> , <i>P. lapathifolium</i> , <i>P. persicaria</i> , <i>Polygonum spp.</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Thlaspi arvense</i> , <i>Viola arvense</i> , <i>Erodium cicutarium</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Euphorbia spp.</i> , <i>Lamium purpureum</i> , <i>Brassica napus</i>	90 – 120 g/ha în 300 L apă Preemergent (BBCH 0)
Floarea-soarelui	Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>C. polyspermum</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Xanthium strumarium</i> , <i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Sorghum halepensis</i> , <i>Stachys annua</i>	90 – 120 g/ha în 300 L apă Preemergent (BBCH 0)
Soia	Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Chenopodium polyspermum</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Xanthium strumarium</i> , <i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Sorghum halepensis</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Stachys annua</i>	80 g/ha în 300 L apă Postemergent când floarea-soarelui are 2-4 frunze (BBCH 12-14) iar buruienile sunt 50% rășărite
Cartof	Buruieni dicotiledonate anuale: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Chenopodium polyspermum</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Xanthium strumarium</i> , <i>Abutilon theophrasti</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Sorghum halepensis</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Stachys annua</i>	90 g/ha în 300 L apă Se aplică preemergent (BBCH 0)
Ceapă	Buruieni dicotiledonate anuale și perene: <i>Amaranthus retroflexus</i> , <i>Chenopodium album</i> , <i>Chenopodium polyspermum</i> , <i>Solanum nigrum</i> , <i>Datura stramonium</i> , <i>Portulaca oleracea</i> , <i>Galinsoga parviflora</i> , <i>Stachys annua</i> , <i>Matricaria inodora</i> , <i>Matricaria species</i> , <i>Stellaria media</i> , <i>Plantago major</i> , <i>Veronica agrostis</i> , <i>Veronica spp.</i>	90 – 120 g/ha în 300 L apă Se aplică preemergent (BBCH 0) Se aplică postemergent când cultura are 2-4 frunze (BBCH 12-14)

Caracteristici tehnice

- Face parte din categoria erbicidelor peliculare cu acțiune reziduală. Degradarea produsului are loc în aproximativ 30 de zile de la aplicare, neafectând rotația culturilor.
- Stopează producerea de clorofilă, urmată de oxidarea membranei celulare și în final de distrugerea celulei. Nu este solubil în apă și poate persista mult timp în sol în primii 5 cm.

Recomandări de utilizare

- **APLICARE PREEMERGENTĂ** – se aplică la culturile de porumb, floarea-soarelui, soia, cartof. Combate buruienile dicotiledonate anuale și inhibă creșterea unor specii de buruieni monocotiledonate. Prezintă acțiune peliculară reziduală.
- **APLICARE POSTEMERGENTĂ** – se aplică la floarea-soarelui. Combate buruienile dicotiledonate anuale și perene. Prezintă acțiune reziduală. Nu se amestecă cu alte produse. Se folosesc 300-400 L apă la hectar.

Principalele buruieni combătute

Foarte sensibile:

Racoviță (*Stellaria media*)
Zărna (*Solanum nigrum*)
Știr (*Amaranthus spp.*)

Laptele cucului (*Euphorbia maculata*)
Teișor (*Abutilon theophrasti*)
Loboda porcească (*Chenopodium album*)

Sensibile:

Traista ciobanului (*Capsella bursa-pastoris*)
Grașiță (*Portulaca oleracea*)
Ciunăfaie (*Datura stramonium*)

Cuvânt de avertizare: **PERICOL**

Pictograme de pericol:



LANCELOT™ SUPER este un erbicid postemergent, selectiv pentru cereale păioase și porumb, acționând asupra buruienilor dicotiledonate anuale și perene.

Certificat de omologare nr. 2861, 18/04/2011
Substanța activă: **aminopirialid 30% + florasulam 15%**

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Grâu	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	33 g/ha postemergent (primăvara, de la înfrățire până la formarea celui de-al doilea internod, iar buruienile au 3-5 frunze)
Orzoaică de primăvară	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	33 g/ha aplicat postemergent (primăvara începând cu înfrățirea, până la formarea celui de-al doilea internod, iar buruienile au 3-5 frunze)
Porumb	Buruieni dicotiledonate anuale și perene	33 g/ha postemergent (primăvara când plantele de porumb au 4-6 frunze)

Mod de acțiune:

- Este un erbicid sistemic, cu pătrundere în principal prin sistemul foliar, iar secundar prin rădăcini. LANCELOT™ SUPER prezintă un mod dublu de acțiune asupra buruienilor:
 - florasulam-ul inhibă acetolactat sintaza (ALS),
 - aminopirialidul acționează ca o auxină sintetică.

Ambele componente se distribuie sistemic în plantă și dereglează metabolismul plantei, afectând procesul de creștere și conducând în final la distrugerea totală a buruienilor.

Spectrul de buruieni combătute:

Buruieni sensibile:
Amaranthus retroflexus, Anthemis arvensis, Beta vulgaris, Brassica oleracea, Capsella bursa-pastoris, Cardaria draba, Centaurea spp, Crysanthemum coronarium, Cirsium arvense, Consolida spp, Galinsoga parviflora, Galium aparine, Matricaria chamomilla, Myagrum perfoliatum, Papaver rhoeas, Polygonum convolvulus, Raphanus raphanistrum, Sinapis arvensis, Sonchus spp, Stellaria media, Vicia sativa, Xanthium strumarium.

Buruieni mediu sensibile:
Chenopodium album (stadiul de 2-4 frunze), *Chrysanthemum segetum, Fumaria spp, Galeopsis tetrahit, Malva spp, Picris echioides, Polygonum aviculare, Bifora spp.*

LANCELOT™ SUPER asigură o combatere eficientă a buruienilor în creștere, iar adăugarea unui adjuvant non-ionic îmbunătățește combaterea în cazul infestărilor cu *Chenopodium spp., Sonchus arvensis, Centaurea spp., Fumaria spp., Malva spp.*, mai ales în condiții de secetă.

Mod de întrebuințare:

- LANCELOT™ SUPER este omologat ca erbicid postemergent pentru combaterea buruienilor dicotiledonate anuale și perene la grâu, orzoaică de primăvară și porumb. Doza de utilizare omologată pentru fiecare cultură este prezentată în tabelul de omologări. În cazul unei infestări puternice cu buruieni dicotiledonate perene, este necesară adăugarea unui adjuvant non-ionic la doza recomandată în România.
- LANCELOT™ SUPER poate fi aplicat primăvara, de la înfrățire până la formarea a celui de-al doilea internod. Temperatura optimă de aplicare este între 8-25°C.

- LANCELOT™ SUPER nu ar trebui aplicat în condiții agrometeorologice nefavorabile dezvoltării și creșterii plantelor (ex: vreme rece, secetă, fertilitate scăzută a solului, precipitații abundente căzute în perioada tratamentului). Pentru a obține cele mai bune rezultate, se recomandă să se erbicideze atunci când buruienile dicotiledonate au 2-6 frunze iar în cazul infestărilor cu *Cirsium arvense*, maxim 10-15 cm înălțime. Volumul de apă recomandat este de 100-400 L/ha. Este necesar să se asigure o acoperire uniformă a buruienilor cu soluția de tratat.
- ATENȚIE! Se va evita aplicarea erbicidului pe culturile agricole dicotiledonate din vecinătate.**

Compatibilitate:

- LANCELOT™ SUPER este compatibil cu erbicide pe bază de isoproturon, clorotoluron, clodinafop, fenoxaprop și cu majoritatea fungicidelor, insecticidelor și fertilizanților foliari. Poate reduce eficacitatea produselor pe bază de iodosulfuron. Pentru o mai mare siguranță se va consulta lista de compatibilitate și se va face un test practic.

Rotația culturilor:

- Timpul de pauză până la înființarea următoarei culturi depinde în principal de tipul de cultură, condițiile de mediu dar și de practicile agricole. Pentru a favoriza descompunerea reziduurilor conținute în paie, se recomandă tocarea și încorporarea acestora cât mai repede posibil. Descompunerea aminopirialidului este mai rapidă în condițiile unui sol cald și cu umiditate și poate fi accelerată prin irigare suplimentară.

Culturile care pot fi înființate după aplicarea LANCELOT™ SUPER:

- După 1 lună (în caz de cultură calamitată): cereale, porumb, sorg. Solul trebuie arat înainte de semănat;
 - Toamna: cereale de toamnă, rapiță de toamnă, pășuni;
 - După 14 luni: linte, năut, soia, fasole, mazăre.
- Pentru alte culturi se recomandă să consultați specialiștii companiei **Summit Agro România**.
- Indicații privind folosirea paielor și a gunoiului de grajd:
Încorporați prin arătură paietele provenite de la culturile tratate cu LANCELOT™ SUPER. Nu comercializați aceste paie, exceptând cazul în care sunt folosite în scop industrial sau ca materie primă pentru producerea de energie termică. Resturile de plante, inclusiv paietele din zonele tratate sau gunoi de grajd de la animale care au consumat paie din zonele tratate, nu pot fi folosite pentru compost sau mulci utilizat în același sezon la culturile sensibile. De asemenea, nu pot fi folosite în seră sau la producerea răsadurilor. Paietele tratate cu aminopirialid sau gunoi de grajd de la animale care au consumat paie provenite din zonele tratate, nu trebuie să fie utilizate pentru patul de cultură, compost sau mulci în producerea ciupercilor.

Gunoiul de grajd provenit din pale tratate cu LANCELOT™ SUPER:

- Poate fi încorporat chiar înainte de semănat la culturile de cereale, porumb, pășuni și rapiță.
- Trebuie să fie încorporat cu cel puțin șase (6) luni înainte de semănat în cazul culturilor de sfeclă de zahăr, cartofi, legume, floarea-soarelui, tomate, castraveți, salată verde, morcovi și orice fel de plantații (livadă, viță-de-vie etc.). Această perioadă de așteptare include doar lunile active, când temperatura solului este de peste +5°C și activitatea microbiană este prezentă.

Atenție! LANCELOT™ SUPER nu permite semănatul leguminoaselor pentru furaj în cultura de cereale (borceag).

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



Lancelot™ SUPER

ERBICID

Protector de ogor



TARGA SUPER®
5 EC

ERBICID

Ambalaje: 1 L și 5 L

TARGA SUPER este un erbicid graminicid sistemic selectiv pentru combaterea buruienilor monocotiledonate anuale și perene.

Certificat de omologare nr. 1159 din 20.04.1989
Substanța activă: Quizalofop-P-etil 50 g/L • Formulare: EC (Emulsie concentrată)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Sfeclă de zahăr	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - postemergent
	Costrei din rizomi (<i>Sorghum halepense</i>)	2 L/ha
Soia	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - postemergent
	Costrei din rizomi (<i>Sorghum halepense</i>)	2,5 L/ha
Floarea soarelui	Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (<i>Setaria</i>), iarba bărboasă (<i>Echinochloa crus-galli</i>), meișor (<i>Digitaria</i>)	0,7 L/ha - postemergent
	costrei din rizomi (<i>Sorghum halepense</i> din sămânță)	
	Costrei din rizomi (<i>Sorghum halepense</i>)	1,5 L/ha
Cartof	Graminee anuale: mohor (<i>Setaria glauca</i> , <i>Setaria viridis</i>), iarba bărboasă (<i>Echinochloa crus-galli</i>)	0,7-1 L/ha - postemergent
	Graminee perene: costrei (<i>Sorghum halepense</i>), pir gros (<i>Agropyron repens</i>)	1,5 - 2 L/ha
Tomate (transplantate)	Buruieni monocotiledonate anuale	1 L/ha - postemergent
Rapiță	Buruieni monocotiledonate anuale: mohor (<i>Setaria</i>), iarba bărboasă (<i>Echinochloa crus-galli</i>), inclusiv samulastră de cereale	1 L/ha - postemergent (buruieni 2-4 frunze, samulastră înainte de înfrățire)
Morcov	Buruieni monocitiledonate anuale	1 L/ha
	Buruieni monocotiledonate perene	2 L/ha
Fasole uscată și păstai (câmp)	Buruieni monocitiledonate anuale	0,8-1,25 L/ha
	Buruieni monocotiledonate perene	1,25-2,5 L/ha
Mazăre uscată	Buruieni monocitiledonate anuale	0,8-1,25 L/ha
	Buruieni monocotiledonate perene	1,25-2,5 L/ha
Mazăre verde boabe	Buruieni monocitiledonate anuale	0,8-1,25 L/ha
	Buruieni monocitiledonate anuale	1,25-2,5 L/ha

- Se aplică post-emergent la:
- buruieni - de la faza de 2 frunze până la sfârșitul înfloritului;
 - cultură - de la faza de 2 frunze (BBCH12) până înainte de momentul acoperirii buruienilor.

Caracteristici tehnice

- Pătrunde rapid în plantă și este transportat până la nivelul sistemului radicular al buruienilor. În acest fel produsul nu distruge doar foliajul, ci combate și previne regenerarea rizomilor.
- Este absorbit prin frunze la câteva ore după aplicare, de aceea nu este condiționat mult de precipitații.
- Efectul maxim se obține în perioada de creștere activă a buruienilor, atunci când acestea au 3-6 frunze.
- Nu se absoarbe prin rădăcini, nu are remanență în sol, fapt pentru care nu prezintă pericol sau restricții pentru cultura următoare.

Cuvânt de avertizare: PERICOL

Pictograme de pericol:



TARGA SUPER[®] 5 EC

ERBICID

Recomandări de utilizare

- Se aplică postemergent, când buruienile monocotiledonate anuale sunt răsărite și se află în primele faze de dezvoltare, 1-3 frunze până la înfrățit, iar pentru cele perene 15-20 cm. Erbicidul nu combate buruienile cu frunza lată, și nici pe cele cu frunza îngustă nerăsărite încă.
- Pentru o combatere corespunzătoare culturile trebuie să fie în primele faze de vegetație astfel încât să nu împiedice contactul soluției de stropit cu buruienile.
- Produsul nu se va amesteca cu fenoxi-erbicidele și cu sulfatul de amoniu.

Principalele buruieni combătute

Monocotiledonate anuale

Coadă vulpii (*Alopecurus myosuroides*);
Meșor (*Digitaria sanguinalis*);
Iarba bărboasă (*Echinochloa crus-galli*);
Raigras (*Lolium spp.*);
Mei (*Panicum spp.*);

Mohor (*Setaria spp.*);
Ovăzcior (*Avena spp.*);
Obsiga (*Bromus spp.*);
Pir (*Eleusine spp.*)

Monocotiledonate perene

Pir târător (*Agropyron repens*);
Pir gros (*Cynodon dactylon*);
Costrei (*Sorghum halepense*);
Mei (*Panicum millaceum*)



ADJUVANȚI ȘI DEZINFECTANȚI SOL
ADJUVANȚI
Flexi 58
IMPROVE 5 în 1 59
Toil 58



DEZINFECTANȚI SOL
Nemasol 510 60





SummiTerra



ACOLO UNDE TEHNOLOGIA ÎNTÂLNEȘTE PĂMÂNTUL

Prezentăm în condiții reale de cultivare:

- tehnologie de vârf pentru porumb, floarea-soarelui, grâu și rapiță;
- rezultatele produselor de la Summit Agro - fertilizanți, biostimulatori și produse pentru combatere biologică.



www.sumi-agro.ro

FLEXI™

ADJUVANT

Ambalaj: 5 L

FLEXI este folosit la cultura rapiței pentru reducerea gradului de scuturare a silicvelor dinaintea și din timpul recoltării.

Formulare: EC (Emulsie concentrată)

Avantajele utilizării produsului

FLEXI împiedică deschiderea silicvelor ajunse la maturitate. Prin aceasta:

- contribuie la reducerea numărului de semințe scuturate;
- îmbunătățește producția și productivitatea;
- reduce apariția samulastrei după recoltare.

FLEXI nu are efecte adverse asupra culturii. Astfel:

- nu diminuează viteza de pierdere a apei și desicare naturală a culturii;
- nu are efecte negative asupra calității semințelor;
- nu afectează gradul de maturare a semințelor.

Mod de acțiune

• Polimerii din produsul FLEXI, după aplicare, formează un "latex" sau o plasă în jurul silicvelor. Această plasă reduce gradul de deschidere a silicvelor.

Recomandări de utilizare

• Aplicați FLEXI în intervalul dintre fenofaza de începutul maturității, până la faza de coacere deplină (semințele sunt negre și tari) (BBCH 80 - 89).

Doze de aplicare

• **Aplicare terestră:** se recomandă în **doze de 0,5 - 1,0 L/ha în 250-400 L apă**. Doza mai mare se recomandă în cazul unor culturi foarte dense, caz în care se va folosi și un volum mai mare de apă.
FLEXI poate fi folosit cu succes în combinație cu erbicide desicante.

TOIL®

ADJUVANT

Ambalaje: 1 L și 5 L

TOIL este un adjuvant pe bază de ulei de rapiță într-o formulare unică, cu emulsificatori de foarte bună calitate, ce permite un amestec complet și omogen cu soluția de stropit.

Adjuvant pe bază de ulei

Caracteristici tehnice

- Îmbunătățește dispersia picăturilor, rezultând o depunere mai mare a soluției de stropit pe suprafața frunzelor;
- Îmbunătățește aderarea erbicidului pe suprafața frunzelor, reducând efectul de spălare al precipitațiilor;
- Permite o penetrare mai bună, ceea ce îmbunătățește absorbția erbicidului în plantă;
- Nu influențează nivelul de reziduuri de erbicid în plantă, permițând ca recoltele să corespundă din punct de vedere calitativ.

Doza de folosire

TOIL se aplică în concentrație de 0,5%. În cazul aplicării unor volume mici de apă doza nu trebuie să fie mai mică de 0,75 L/ha.

IMPROVE 5in1

ADJUVANT

Ambalaje: 1 L și 5 L

IMPROVE 5 în 1 este un adjuvant complet, folosit pentru reglarea pH-ului și a conductivității apei pentru stropit.

Adjuvant

Produsul are 5 efecte benefice care vor îmbunătăți efectul aplicării foliare a produselor pentru protecția plantelor și fertilizantilor.

Caracteristici tehnice

IMPROVE 5 în 1 are 5 tipuri de acțiuni benefice pentru apa de stropit:

1. Efect acidifiant, prin reducerea pH-ului apei și menținerea lui până la nivelul optim: 5 (se poate ajunge și la un pH de 3-4 la doze mari de produs).
2. Are încorporat un indicator de pH. Se poate afla ușor când pH-ul este cel dorit, prin apariția unei colorații roz a soluției de stropit.
3. Conține umectanți care mențin umiditatea la nivelul frunzei, oferind beneficiul penetrării superioare a substanțelor în plantă și a absorbției sporite a nutrienților.
4. Este agent surfactant și penetrant. Conține substanțe ce reduc tensiunea superficială de la nivelul frunzei, care duc la dispersarea uniformă și la sporirea contactului produselor pe suprafețele plantei și implicit penetrarea în plantă.

5. Reduce duritatea apei prin inactivarea sărurilor de Ca sau Mg și reglează conductivitatea.

Recomandări de utilizare:

Aplicați IMPROVE 5 în 1 în soluția de stropit (înainte de a aplica orice altă substanță), turnați și amestecați continuu, până când soluția devine roz (pH 5). Dacă se dorește un nivel al pH-ului de 6, trebuie să se toarne în continuare produsul, până când soluția devine portocalie.

Dozele recomandate de IMPROVE 5 în 1:

Clasificarea durității apei	Conductibilitatea apei (μS/cm)	Doza recomandată (mL/100 L)
Moale	< 150	40-50
Medie	200-300	50-60
Moderat dură	300-400	100-120
Dură	400-450	180-200
Foarte dură	>500	>200

NEMASOL™
510

DEZINFECTANT SOL

Ambalaj: 25 L

NEMASOL 510 este un dezinfectant al solului cu spectru multiplu de combatere: nematozi, dăunători și agenți patogeni de sol, buruieni.

Certificat de omologare nr. 2275 din 27.05.2004
Substanța activă: **Metam de sodiu 510 g/L** • Formulare: SL (Lichid solubil în apă)

Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Tomate si castraveți	Agenți patogeni, dăunători, (culturi protejate) buruieni specifice	700 L/ha. Se aplică tratamente la sol odată cu irigarea prin picurare, cu 21 de zile înainte de plantarea culturilor. Temperatura în sol trebuie să fie de minimum 15°C în momentul aplicării tratamentului.

Caracteristici tehnice

- RECOMANDĂM aplicarea produsului NEMASOL 510, utilizând sistemul de irigare prin picurare.
- Diluția recomandată este de 1 – 5%. Timpul de irigare cât și norma de apă administrată trebuie să fie foarte corect calculată, astfel încât produsul să fie aplicat în doza omologată.
- Produsul NEMASOL 510 în contact cu solul umed se transformă în gaz, care are rolul de a dezinfecta solul (zona în care a fost administrat) sau substratul de cultură.
- Asigură protecție de lungă durată împotriva nematozilor, agenților patogeni și buruienilor, oferind fermierilor posibilitatea de a avea culturi succesive pe aceeași suprafață (cel puțin 2 cicluri de cultură).
- Influențează foarte mult cheltuielile referitoare la combaterea buruienilor din culturile tratate cu NEMASOL 510.
- NEMASOL 510 este descompus în sol, fără a lăsa reziduuri care ar putea fi absorbite de plantele de cultură.


Recomandări de utilizare

- NEMASOL 510 este solubil în apă, oferind ușurință în administrare odată cu irigarea culturilor (utilizând sistemul de irigare prin picurare). Această metodă de aplicare asigură o distribuție bună a gazului pe verticală și orizontală.
- Tratamentele cu NEMASOL 510 se fac în perioada dintre 2 culturi succesive pe terenul eliberat, curățat de resturi vegetale.


Important de reținut

- Suprafața de teren pe care urmează a fi aplicat NEMASOL 510 trebuie irigată cu 1 – 2 săptămâni înainte de tratament. Umiditatea solului trebuie să fie aproximativ la 50 – 60% din capacitatea solului.
- Distanța dintre benzile de irigat prin picurare trebuie să fie stabilită în funcție de textura solului. Pe solurile mai nisipoase distanța recomandată între benzile de irigare este de 20 – 30 cm, iar pe solurile mai bogate în argilă distanța între benzi este de 40 – 50 cm.
- Norma de apă care trebuie administrată se va calcula în funcție de tipul solului. Această irigare se va face cu 1-2 săptămâni înainte de aplicarea produsului NEMASOL 510.
- După aplicarea produsului NEMASOL 510, suprafața tratată trebuie să fie acoperită cu folie de plastic pentru a permite o distribuție uniformă a gazului rezultat. În acest fel, solul tratat rămâne în contact cu gazul și are loc o dezinfecție totală a zonelor tratate.

Aplicare condiții de sol




USCAT, fără acoperire



UMED + acoperire

- Acoperire
- apă
 - plastic
 - tăvălugire

Irigare prin picurare



Cuvânt de avertizare: **PERICOL**

Pictograme de pericol:



FERTILIZANȚI

Elite
Fertigofol Ultra
Sulfomax Fluid

66
63
64



FERTILIZANȚI



FERTIGOFOL ULTRA este un fertilizant foliar - complex NPK - la care se adaugă micronutrienți.

FERTILIZANT FOLIAR

Ambalaje: 1 L și 10 L

Compoziția chimică

Azot (N)	8,9% (107 g/L)
Oxid de potasiu (K ₂ O)	7,2% (86 g/L)
Pentaoxid de fosfor (P ₂ O ₅)	3% (32 g/L)
Oxid de magneziu (MgO) chelat EDTA	0,11% (1,3 g/L)
Trioxid de sulf (SO ₃)	0,11% (1,3 g/L)
Bor (B)	0,042% (500 mg/L)
Mangan (Mn) chelat EDTA	0,042% (500 mg/L)
Zinc (Zn) chelat EDTA	0,034% (400 mg/L)
Fier (Fe) chelat EDTA	0,021% (250 mg/L)
Cupru (Cu) chelat EDTA	0,012% (140 mg/L)
Molibden (Mo)	0,004% (50 mg/L)

Caracteristici tehnice

- FERTIGOFOL ULTRA combină macroelemente și microelemente esențiale pentru o îmbunătățire a întregii stări de nutriție a plantelor.
- Balanța macroelementelor este apropiată de necesarul plantelor, iar unele microelementele sunt sub o formă chelată îmbunătățind absorbția, asimilarea și circularea lor în plantă.
- Potențează procesele fiziologice în celule, îmbunătățește fotosinteza și mărește capacitatea de preluare a elementelor minerale prin sistemul radicular. Se stimulează creșterea sistemului vegetativ. Aminoacizii sunt parte componentă a proteinelor. În procesul de sinteză a proteinelor, plantele consumă foarte multă energie. Având aminoacizi la dispoziție, plantele salvează energie, care va fi folosită pentru alte procese fiziologice (fructificare, creșteri vegetative).

Recomandări de utilizare

Cultura	Doză / Concentrație L/ha	Moment de aplicare
Cereale păioase	3-5	De la al doilea nod (odată cu erbicidatul) până la burduf și apoi de la apariția frunzei stindard până la înspicat
Leguminoase, mazăre	3-5	De la 5-10 cm până la începutul înfloriturii
Cartof	3-5	3-4 aplicări de la începutul formării tuberculilor, apoi odată la 14 zile
Porumb, rapiță, sfeclă de zahăr	3-5	1-2 aplicări după răsărit, apoi când este suficient foliaj
Legume	3-5	3-4 aplicări la 10-14 zile
Pomi fructiferi	3-5	4 aplicări de la căderea petalelor, apoi la fiecare 14 zile
Viță de vie	3-5	2-3 aplicări de la începutul înfloriturii și înainte de compactarea ciorchinului, apoi la fiecare 14 zile

Se folosește un volum de apă conform recomandărilor pentru fiecare cultură, dar nu mai puțin de 100 L/ha.

Cuvânt de avertizare: PERICOL

Pictograme de pericol:



SULFOMAX™ FLUID

FERTILIZANT FOLIAR

Ambalaj: 10 L

SULFOMAX™ FLUID este un fertilizant foliar pe bază de trioxid de sulf, ușor accesibil plantelor.

Compoziția chimică	
Trioxid de sulf (SO ₃)	1000 g/L
Azot (N)	30 g/L
Oxid de magneziu (MgO)	30g/L
Bor (B)	27 g/L
Molibden (Mo)	3 g/L

Caracteristici și avantaje

Dinamica și circuitul sulfului în sol sunt asemănătoare cu cele ale azotului (N). Este important să asigurăm culturile cu aceste 2 elemente, în momentele potrivite pentru a asigura stabilitatea nivelului de producție și calitatea acestora.

În funcție de starea culturii și de gradul de aprovizionare a solului, carența de sulf (S) duce la pierderi importante de producție la culturile de rapiță și floarea-soarelui.

Lipsa sulfului (S) la rapiță

- poate duce la regresia și dispariția mugurelui terminal
- întârzierea ramificării tulpinilor
- crăpături longitudinale ale tulpinilor
- număr redus de silicve
- număr redus de boabe în silicvă

Lipsa sulfului (S) la floarea-soarelui

- reduce nivelul producției
- reducerea suprafeței foliare
- se pot produce malformații ale capitulului
- scade conținutul de ulei din semințe

Prezența echilibrată a elementelor nutritive din produs, momentele optime de aplicare a acestuia, în funcție de cerințele specifice culturilor și de momentele de consum maxim, duc la obținerea unor producții ridicate și sporirea conținutului de ulei din boabe, atât la rapiță cât și la floarea-soarelui.

De ce să folosim SULFOMAX FLUID?

Combinția de sulf în concentrație mare cu azot (N), magneziu (Mg), molibden (Mo) și bor (B), asigură o bună dezvoltare a culturii de rapiță și floarea-soarelui. Reprezintă un concept nou de nutriție a plantelor prin modul de formulare a sulfului:

Cum se folosește SULFOMAX FLUID?

- Este de dorit ca aplicarea, mai ales în cazul celui de-al doilea tratament, să se facă cu echipamente terestre, în măsura în care acest lucru este posibil.
- Se umple rezervorul instalației jumătate cu apă, se adaugă produsul, se completează cu apă. Produsul, în ambalajul original se agită bine, înainte de adăugare în tanc. Sistemul de agitare al instalației trebuie să funcționeze permanent. După golirea recipientului, se clătește cu apă curată de 2 ori și se varsă conținutul în rezervorul instalației de aplicat.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



SULFOMAX™ FLUID

FERTILIZANT FOLIAR

Formulare clasică cu sulf

Produs de contact

Scop - să stea o perioadă cât mai mare de timp pe suprafața frunzei pentru a o proteja de făinare.

10 - 15% din sulf intră în plantă

Recomandări de utilizare

Cultura	Doză / Concentrație	Număr de tratamente	Moment de aplicare
Rapiță	3 L/ha	1-2	De la dezvoltarea aparatului foliar până la alungirea tulpinii
Floarea-soarelui	3 L/ha	1	De la stadiul de 6 frunze până la 12 frunze
Cereale	3 L/ha	1-2	De la înfrățit până la înspicat
Viță de vie	3 L/ha	1-2 1-2	Înainte de înflorit După înflorit

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



ELITE™

FERTILIZANT FOLIAR

Ambalaj: 25 Kg

ELITE™ este un fertilizant foliar cu azot lichid, ușor accesibil plantelor de cultură.

Compoziția chimică		
Azot (N) total din care: azot ureic azot nitric (NO ₃)	20%	
	18%	
	2%	
Pentaoxid de fosfor (P ₂ O ₅)	20%	
Oxid de potasiu (K ₂ O)	20%	
Oxid de magneziu (MgO)	2,2%	
Sulf (S)	1,8%	

Caracteristici și avantaje

- Asigură un aport suplimentar de elemente nutritive necesare unei creșteri și dezvoltări corespunzătoare.
- Contribuie la obținerea unor producții ridicate.
- Crește rezistența plantelor la boli și dăunători.
- Se poate utiliza la orice cultură.
- Liber de cloruri, carbonați și metale grele.
- Nu este fitotoxic la dozele recomandate.
- Se aplică atât foliar cât și prin fertirigare.

Instrucțiuni de folosire

- Fiecare cultură are cerințe de nutriție specifice, are momente de consum maxim pentru anumite elemente nutritive, neasigurarea la timpul potrivit a acestor nutrienți având influență negativă directă asupra rezultatelor de producție. Principalul avantaj al aplicării faziale, fracționate a îngrășămintelor foliare, este acela de a asigura o doză suplimentară de elemente nutritive, la timpul potrivit, în momentele de consum maxim ale plantelor de cultură. În perioadele de secetă severă și prelungită, aplicarea fertilizanților foliari ajută culturile să suporte mai ușor stresul hidric. ELITE corectează deficiențele de nutriție și poate atenua efectul negativ al factorilor de mediu.

Când se aplică ELITE?

- Când dorim să utilizăm la maximum întregul potențial de producție al plantelor.
- Când dorim o creștere a rezistenței la factorii de stres.
- Când în sol există un dezechilibru între anumite elemente.

Cum se utilizează corect fertilizanții cu aplicare foliară?

- Evitați aplicarea tratamentelor în condiții climatice extreme cum ar fi: ploaie, arșiță, vânt puternic sau când se anunță pericol de îngheț sau ploaie.
- ELITE este compatibil în amestec cu majoritatea produselor de uz fitosanitar. Recomandăm efectuarea unui test de compatibilitate.


Recomandări de utilizare

Cultura	Doză / Concentrație	Moment de aplicare	Volumul de apă recomandat
Cereale	2,5-3 kg/ha	În timpul perioadelor de creștere intensivă a plantelor	200-300 L/ha
Porumb, soia, floarea-soarelui	2,5-3 kg/ha	Se recomandă 1-5 aplicări în funcție de cultură și sezon	200-300 L/ha
Cartof	2,5-3 kg/ha	Se aplică până la sfârșitul perioadei formării tubercuilor	200-300 L/ha
Pomicultură (măr, păr, piersic, cais, prun)	2,5 kg/ha	Aplicat în perioadele de creștere intensivă	1000-1500 L/ha
Viță de vie	2,5 kg/ha	Se aplică de la începutul perioadei de vegetație, ori de câte ori este necesar	600-1000 L/ha
Legume (tomate, ardei, pepeni, țelină, varză, morcov)	2,5 kg/ha	Prima aplicare se recomandă după 3-4 săptămâni de la răsărire sau la 2 săptămâni după transplantare și se repetă la 10-14 zile de aproximativ 4-5 ori.	600-1000 L/ha



GAMA BIO – SEIPRO

BrasiPro	69
Kaishi	70
Kinactiv Fruit	72
Kinactiv Root	74
NoFly WP	76
Shigeki	78



NO
FLY

Insectele NU-i rezistă

Recomandat și pentru agricultura ecologică

Acțiune rapidă



Protecție dovedită



Protejează entomofauna utilă



BRASIPRO®

FERTILIZANT

Ambalaj: 10 L

BRASIPRO este un fertilizant cu aplicare foliară, condiționat sub formă de suspensie concentrată (SC).

Compoziția chimică

Bor (B) solubil în apă (80 g/L)	5,8%
Azot (N) (60 g/L)	4,5%
Anhidridă sulfurică (SO ₃) (55 g/L)	4%
Oxid de magneziu (MgO) (28 g/L)	2%
Molibden (Mo) solubil în apă (1 g/L)	0,075%



Recomandări de utilizare

- RAPIȚĂ → Doză: 3-4 L/ha. Recomandăm 1-2 aplicări în perioada de vegetație, începând cu faza de 2-3 frunze, până la începerea înfloririi.
- FLOAREA-SOARELUI → Doză: 3-4 L/ha. Recomandăm efectuarea a 2 aplicări în perioada de vegetație; Prima aplicare atunci când plantele de floarea-soarelui au 5 perechi de frunze, iar cea de-a II-a aplicare până la faza de formare a butonului floral (pre-înflorire).
- PLANTE OLEAGINOASE BRASICACEE → Doză: 3-4 L/ha. Se recomandă 1-2 aplicări începând cu stadiul de 2-4 frunze și până la începutul înfloritului.
- SFECLĂ → Doză: 3-4 L/ha. Recomandăm 2 aplicări în perioada de vegetație; prima aplicare se face în perioada de creștere intensă a plantelor de sfeclă (atunci când plantele au 4-6 frunze adevărate), iar a II-a aplicare atunci când cultura de sfeclă este bine stabilită (frunzele acoperă intervalul dintre rândurile de plante).
- STRUGURI ȘI POMI FRUCTIFERI → Doză: 2,5-3 L/ha. Recomandăm 2-3 aplicări, începând cu faza pre-florală, până la formarea fructelor.
- ALTE CULTURI → Doză: 3-4 L/ha. Recomandăm 1-2 aplicări la interval de 10-14 zile pe culturile bine stabilite.

Cuvânt de avertizare: **PERICOL**

Pictograme de pericol:





BIOSTIMULANT

KAISHI este un produs certificat OKO pentru utilizare atât în agricultura organică, cât și în cea clasică

Ambalaj: 1 L și 5 L

Compoziția chimică % w/w % w/v

L-Aminoacizi de origine vegetală	12,00	13,40
Azot total organic (N)	2,00	2,20
Aminoacizi obținuți prin hidroliză enzimatică a proteinelor vegetale		
Bor (B)	0,13	0,17
Acid aspartic	0,80	0,86
Acid glutamic	4,30	4,60
Histidină	0,26	0,28
Serină	0,35	0,38
Glicină	2,55	2,75
Treonină	0,12	0,13
Arginină	0,37	0,40
Alanină	0,58	0,63
Tirozină	0,08	0,09
Valină	0,04	0,43
Metionină	0,10	0,11
Fenil-alanină	0,42	0,45
Izoleucină	0,07	0,07
Leucină	0,43	0,46
Lizină	3,30	3,56
Hidroxiprolină	0,09	0,09
Prolină	0,38	0,41
Triptofan	0,02	0,02

KAISHI este un biostimulant cu o formulă unică, ce conține aminoacizi de natură vegetală, extrași prin procesul de hidroliză enzimatică, și azot (N) organic.

Caracteristici tehnice

- KAISHI este un biostimulant condiționat sub formă de lichid de culoare galben-marونی, având miros specific, o densitate de 1,06 – 1,10 kg/L, un pH cuprins între 4,0 – 5,0 (măsurat la o temperatură de 20°C).
- KAISHI a fost dezvoltat după ce specialiștii companiei Futureco BioScience au întreprins numeroase cercetări în domeniul metabolismului aminoacizilor și influența lor în procesele fiziologice ale plantelor. Aminoacizii din componența produsului KAISHI sunt obținuți prin procesul de „hidroliză enzimatică a proteinelor” de natură vegetală. Un amestec echilibrat de exoproteine și endoproteine specifice supuse procesului de hidroliză enzimatică conduce la obținerea a 92% L-aminocizi liberi. KAISHI are în componență L-aminoacizi liberi de origine vegetală și azot (N) organic. KAISHI este mult mai activ decât alte produse obținute prin procedee convenționale de hidroliză (hidroliză acidă, hidroliză simplă sau dublă). Prin hidroliză enzimatică sunt obținuți L-aminoacizi de o calitate mult mai pură deoarece nu conțin substanțe insolubile. Compoziția produsului KAISHI nu variază de la un lot la altul, deoarece materiile prime utilizate sunt întotdeauna aceleași, astfel încât produsul nu arată diferențe de eficacitate la loturi diferite.



KAISHI este un biostimulator recomandat pentru utilizarea în culturile agricole din România, pentru **intensificarea proceselor fiziologice și o revigorare a plantelor care suferă de stres** (cauzat de fito-toxicitate dată de anumite produse de protecție a plantelor, secetă, inundații, temperaturi mari / mici), pentru dezvoltarea masei foliare, pentru a influența pozitiv conținutul de proteină în plante și pentru a aduce un plus de energie în procesul de biosinteză a uleiului în cazul plantelor oleaginoase.

Mod de acțiune

- KAISHI este un biostimulant puternic și cu rezultate sigure, **utilizat în procesele de recuperare a plantelor după o perioadă de stres** cauzată de lipsa apei, căldură, săruri în exces sau stres cauzat de aplicarea unor pesticide mai agresive.



BIOSTIMULANT

Omologări în România

Cultura	Doză / Concentrație	Recomandare de aplicare
Măr	2 L/Ha	2 tratamente pe perioadă de vegetație; tratamentul 1 se aplică atunci când fructele au până la 40 mm în diametru (BBCH 74 -75), iar tratamentul 2 se aplică la un interval de 10 – 15 zile calendaristice de la T1.
Viță de vie	2 L/Ha	Se aplică un tratament în perioada de formare a boabelor (BBCH 71), sau atunci când planta suferă de stres.
Cartof	3 L/Ha	Se aplică 2 tratamente. Tratamentul 1 se aplică la începutul înfloritului (BBCH 51-55), iar tratamentul 2 se aplică la un interval de 10-15 zile calendaristice de la T1

Cum acționează KAISHI în plantă?

- KAISHI L-aminoacizii liberi (AA) conținuți în produsul KAISHI stimulează metabolismul plantelor, în special în situații în care au suferit datorită stresului de mediu și prin urmare, crește randamentul culturilor. De asemenea, L-aminoacizii liberi sunt implicați în:
 - Activarea sistemului de fotosinteză
 - Reglarea activității stomatelor
 - Recuperarea plantelor care suferă de stres
 - Stimulează procesul de întărire a peretelui celular
 - Cresc activitatea de polenizare și de formare a fructelor
 - Îmbunătățesc procesul de formare a hormonilor naturali în plante (auxinele)
 - Îmbunătățesc procesul de absorbție și utilizare a microelementelor necesare plantelor
 - Acționează ca un co-adjuvant-aplicat împreună cu produse pentru protecția plantelor și nutrienților foliari.
- KAISHI poate fi aplicat în orice moment în timpul perioadei de vegetație a culturilor, în special după stresul cauzat de secetă, îngheț, atac masiv al dăunătorilor și agenților patogeni sau după aplicarea produselor pentru protecția plantelor pentru a ajuta planta să-și revină din stres. Tratamentele cu KAISHI se vor repeta la un interval de 10 - 15 zile (conform omologării din tabelul de mai sus), folosind suficientă apă în amestec pentru a acoperi întreaga masă foliară. Datorită aderenței sale puternice și a acțiunii de penetrare, se recomandă efectuarea testelor de compatibilitate pe o suprafață mică înainte de a face amestecuri cu produse pentru protecția plantelor. KAISHI a fost testat în condițiile pedoclimatice din diferite zone ale României, având rezultate foarte bune. Portofoliul de culturi la care poate fi utilizat acest produs este în curs de extindere în 2019 în conformitate cu legislația din domeniu și aplicată de autoritățile din România.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:





BIOSTIMULANT

KINACTIV FRUIT este un produs certificat OKO pentru utilizare și în agricultura organică..

Ambalaj: 1 L, 5 L și 20 L

Compoziția chimică	% w/w	% w/v
Aminoacizi liberi de tip L	4,00	5,00
Fosfor (P ₂ O ₅)	12,00	16,00
Potasiu (K ₂ O)	16,00	21,00
Bor (B)	0,50	0,70
Molibden (Mo)	0,05	0,07
Cupru (Cu-EDTA)	0,002	0,003
Fier (Fe-EDTA)	0,20	0,30
Mangan (Mn-EDTA)	0,01	0,02
Zinc (Zn-EDTA)	0,002	0,003
Aminograma Standard		
Acid glutamic	1,50	2,10
Glicină	1,00	1,40
Lizină	1,00	1,40
Metionină	0,50	0,70

- **GLICINA** – aminoacid cu rol în potențarea procesului de „foto-asimilare”. Are rol important în procesul de fotosinteză, care crește procentul de absorbție foliară a nutrienților și ajută la creșterea fructelor, cât și la obținerea unor fructe de formă și mărime specifică soiului.
- **LIZINA** – aminoacid care contribuie la creșterea conținutului de proteină, ducând la întărirea membranei și peretelui celular. Crește procentul de germinare a polenului, rezultând o mai bună fructificare.
- **METIONINA** – aminoacid precursor de poliamine care intensifică procesul de biosinteză a etilenei în plantă și este un precursor al procesului de formare a giberelinelor. Acest fenomen intensifică dezvoltarea uniformă a fructelor, procesul de maturizare, creșterea conținutului de zahăr și creșterea fermității fructelor post-recoltare (menține fermitatea fructelor în depozit pentru o perioadă mai lungă).
- **POTASIU (K)** - ajută la dezvoltarea fructelor în forma specifică soiului, creșterea conținutului de zahăr și o colorație intensă a fructelor.
- **BOR** – ajută la dobândirea rezistenței la depozitare. Împreună cu calciul, are un rol decisiv în stabilitatea peretelui celular și menținerea fermității fructelor în perioada depozitării.
- **FOSFORUL** – ajută la creșterea rezistenței fructelor la condițiile de depozitare. Reduce procesele de degradare a calităților acestora în perioada de depozitare.

Recomandări de utilizare

Cultura	Doză / Concentrație	Recomandare de aplicare
Măr	2 L/Ha	2 tratamente în perioada de vegetație
Viță de vie	2 L/Ha	2 tratamente în perioada de vegetație
Cucurbitacee	2 L/Ha	2 tratamente în perioada de vegetație

Biostimulant pe bază de L-aminoacizi liberi de origine vegetală și microelemente pentru susținerea fructificării, îmbunătățirea procesului de acumulare a zaharurilor și stabilizarea colorației fructelor.



Caracteristici tehnice

- **KINACTIV FRUIT** este un biostimulant cu aplicare foliară, condiționat sub formă de lichid de culoare albastră, având miros specific, o densitate de 1,28 – 1,32 kg/L, un pH cuprins între 8,5 – 9,5 (măsurat la o temperatură de 20°C). Are în componență L-aminoacizi liberi de origine vegetală, fosfor (P₂O₅), potasiu (K₂O), bor (B) și o paletă largă de microelemente chelatare (EDTA).

Mod de acțiune

- În procesul de dezvoltare, **fructele** au nevoie să acumuleze acidul gama-aminobutiric (GABA) care, este un aminoacid important în structura lor. **KINACTIV FRUIT** are în componența sa **acidul glutamic**, care este precursor al GABA. Este un constituent important al multor aminoacizi și ajută la activarea nitrat-reductazei (NR), îmbunătățind procesul de metabolizare a azotului.




BIOSTIMULANT

Recomandări de aplicare

- **Măr** - Primul tratament recomandăm să fie făcut atunci când fructele au 40 mm în diametru și poziție erectă (BBCH 74-75). Al doilea tratament se aplică la 15 zile calendaristice de la primul tratament.
- **Viță de vie** - Primul tratament recomandăm să fie făcut la formarea boabelor, iar cel de al doilea după 15 zile calendaristice de la primul tratament.
- **Cucurbitacee** - Recomandăm aplicarea primului tratament la începutul înfloririi, iar cel de-al doilea tratament la 15 zile de la primul.
- **KINACTIV FRUIT** a fost aplicat foliar pe multe culturi agricole și testat în condițiile pedoclimatice din diferite zone ale României, având rezultate foarte bune.
- NU recomandăm utilizarea produsului în tank-mix cu produse care au în compoziție calciu (Ca), cupru (Cu) sau magneziu (Mg).
- În continuare vă prezentăm rezultatele obținute în 2018 la cultura de viță de vie în zona Pietroasele și Dealu Mare.


Tămâioasă românească

producția t/ha




Fetească neagră

producția t/ha



Zahăr

g/L must



Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



Compoziția chimică	% w/w	% w/v
L-Aminoacizi de origine vegetală	4,00	5,00
Azot total (N)	12,00	16,00
Bor (B) solubil în apă	16,00	21,00
Fier (Fe) solubil în apă	0,50	0,70
Molibden (Mo) solubil în apă	0,05	0,07
Mangan (Mn-EDTA) solubil în apă	0,002	0,003
Zinc (Zn-EDTA) solubil în apă	0,20	0,30
Aminogramă standard		
Acid glutamic	7,00	9,24
Glicină	2,50	3,30
Triptofan	0,20	0,25
Metionină	1,00	1,32

Produsul **KINACTIV ROOT**, prin formula sa unică, a fost special creat pentru a ajuta plantele să-și dezvolte foarte bine sistemul radicular și totodată resursele proprii, utilizându-le în alte procese fiziologice. Optimizează capacitatea nutrițională a plantei, ducând la o dezvoltare completă a acesteia, cât mai aproape de potențialul genetic al plantelor de cultură. Prin conținutul de auxine, declanșează inițierea rădăcinii principale, alungirea și formarea rădăcinilor laterale. Poliaminele participă împreună cu auxinele la procesul de diviziune și diferențiere a celulelor cât și la inițierea formării rădăcinilor plantelor de cultură. Giberelinele au un rol important în formarea sistemului radicular specific plantelor de cultură. Citochininele reglează creșterea țesuturilor meristemate (RAM), dimensiunea și diferențierea celulelor în zona de alungire a rădăcinilor. Efectul sinergic dat de cele două componente-triptofan și acid glutamic, ajută foarte mult la dezvoltarea arhitecturii sistemului radicular și ajută la o dezvoltare completă a rădăcinilor.

KINACTIV ROOT stimulează absorbția mineralelor chiar și în cazuri de secetă, menținând umiditatea solului din jurul sistemului radicular. Are rol în activarea enzimelor cu rol în asimilarea azotului, ceea ce duce la generarea unui sistem vegetativ mai bogat și îmbunătățește procesul de fotosinteză a plantelor. În corpul plantei acționează ca un activator de enzime de biosinteză și precursor de clorofilă. Acest aspect duce la creșterea capacității plantei de a produce energia necesară în procesele fiziologice.

Cultura	Doză / Concentrație	Recomandare de aplicare
Tomate	2 L/Ha	2 tratamente pe perioada de vegetație: tratamentul 1 imediat după transplantare, iar tratamentul 2 la un interval de 10 – 15 zile calendaristice
Ardei	2 L/Ha	

KINACTIV ROOT este un biostimulant cu o formulă unică, cu o arhitectură echilibrată de elemente, destinat îmbunătățirii procesului de dezvoltare a sistemului radicular.

Caracteristici tehnice

- KINACTIV ROOT** este un biostimulator condiționat sub formă de lichid de culoarea maro închis, având miros specific, o densitate de 1,26 – 1,30 kg/L și un pH cuprins între 6,0 – 7,0 (măsurat la o temperatură de 20°C). Are în componență L-aminoacizi liberi de origine vegetală, azot (N), bor (B) și o paletă largă de microelemente chelatare (chelare EDTA). Este recomandat pentru utilizarea în culturile agricole din România, pentru intensificarea dezvoltării sistemului radicular al plantelor. L-aminoacizii conținuți de produsul **KINACTIV ROOT**, obținuți prin fermentarea bacteriană, sunt mult mai accesibili plantelor.

Mod de acțiune

- În procesul de dezvoltare a sistemului radicular, plantele de cultură au un consum foarte mare de resurse (aminoacizi, macro și microelemente).



Recomandări de utilizare

KINACTIV ROOT se aplică la sol prin sistemul de irigare prin picurare. Pentru culturile agricole care trec prin procese de transplantare, recomandarea de utilizare este imediat după transplantare și cu repetarea celui de al II-lea tratament într-un interval de 7-10 zile calendaristice. De asemenea, recomandăm utilizarea produsului **KINACTIV ROOT** în culturile care au sistemul radicular stresat sau în degradare, fie din cauza atacului dăunătorilor de sol, fie din alte cauze (secetă prelungită, îngheț de scurtă durată etc.). Aplicarea produsului se face imediat ce a fost semnalat atacul, folosind sistemul de irigare prin picurare și la doza omologată și prezentată în tabelul de omologări.

Produsul **KINACTIV ROOT** a fost testat în condițiile pedoclimatice din diferite zone ale României, având rezultate foarte bune. Portofoliul de culturi la care poate fi utilizat acest produs este în curs de extindere în 2019 în conformitate cu legislația din domeniu și aplicată de autoritățile române.

Variante experimentale

V1 – netratat (2.700 m²)
V2 – Kinactiv root (2.700 m²)
2 L/ha

primul tratament, imediat după plantare (09.07.2018) + 4 tratamente, la interval de 3 săptămâni:
iulie 22
august 7
august 23



Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



Cultura	Organismul dăunător	Doză / Concentrație
Tomate (spații protejate)		
Ardei (spații protejate)	Musculița albă de seră (<i>Trialeurodes vaporariorum</i>)	0,2 – 0,25% (într-un volum recomandat de 1000 L apă)
Pepeni (spații protejate)		
Dovelecel (spații protejate)		

Caracteristici tehnice

- **NoFly WP** este un insecticid biologic care are ca substanță activă o concentrație mare de blastospori vii ai ciupercii parazite „*Paecilomyces fumosoroseus*” tulpina FE 9901 și alte ingrediente inerte de natură organică.
- Acest microorganism, „*Paecilomyces (Isaria) fumosoroseus*” tulpina FE 9901, este o ciupercă naturală, agresivă, parazit natural al unor specii de insecte și este folosit pentru a combate insectele dăunătoare din culturile agricole.
- **NoFly WP** este selectiv în același timp pentru insectele utile. FE 9901 este o tulpină izolată specifică, destinată controlului biologic al musculiței de seră și combate dăunătorii în toate etapele de viață: ou, larvă și adult. Gazde suplimentare pentru *Paecilomyces fumosoroseus* sunt tripsul florilor, păduchi, gândaci de masă, alte insecte și omizi.

Modul de acțiune

- Când produsul **NoFly WP** intră în contact cu insectele dăunătoare, spori se atașează de corpul acestora.
- Odată ce *P. fumosoroseus* pătrunde în cuticula insectei gazdă, multiplicarea fungică are loc prin formarea de hife în hemocoel. Ciclul de infectare al *Paecilomyces fumosoroseus* este unul deosebit de rapid, simptomele cauzate de ciupercă fiind evidente în termen de 24 până la 48 de ore după ce conidia intră în contact cu insecta. Organele interne ale gazdei sunt apoi perturbate mecanic, se inițiază necroza țesuturilor și pierderea funcțiilor vitale.

Rezultatul final?

- Insectele dăunătoare care intră în contact cu produsul **NoFly WP** își opresc hrănirea în aproximativ 24 de ore și sunt distruse în totalitate într-un timp estimat de 2-5 zile.
- *P. fumosoroseus* nu este un organism patogen plantelor și nu produce efecte dăunătoare semnificative asupra insectelor benefice, inclusiv a albinelor. Singurele reziduuri derivate din aplicare produsului **NoFly WP** sunt spori, care au o perioadă scurtă de viață, dar care nu prezintă probleme de persistență în mediu (sol, apă sau aer). Aceste caracteristici fac **NoFly WP** un produs ideal pentru programele integrate de combatere care utilizează și organisme benefice în combaterea dăunătorilor din culturile de seră.

Recomandări de utilizare

- Primele aplicări trebuie efectuate după observarea primelor semne ale prezenței dăunătorilor pe frunze.
- Repetați tratamentul la un interval de 5-7 zile.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



- Numărul maxim de aplicări este de 4 aplicări pe sezon. Nu au fost semnalate cazuri de rezistență la acest produs, însă atunci când sunt semnalmente, pentru a reduce probabilitatea apariției acestui fenomen de rezistență redusă a dăunătorului, vă recomandăm să măriți intervalul dintre tratamente la 15 zile.
- Producătorii pot utiliza pentru administrare oricare tip de echipament de pulverizare pe care îl au. Aplicați cu pulverizatoare hidraulice sau dispozitive echivalente, utilizând o duză de tip con și o presiune de 10 bari. Vă recomandăm să utilizați un volum de apă adecvat și recomandat fiecărei culturi, pentru a garanta o îmbăiere foarte bună (totală) a întregului sistem foliar.
- Substanța activă a produsului **NoFly WP** (blastospori vii ai ciupercii parazite „*Paecilomyces (Isaria) fumosoroseus*”) se poate degrada, dacă produsul este depozitat la temperaturi ridicate sau este ținut în contact cu apa mai mult de 24 de ore.
- **NoFly WP** este, de asemenea, compatibil cu multe substanțe chimice, ceea ce îl face un instrument excelent pentru utilizarea sa într-un program integrat de combatere a dăunătorilor. **NoFly WP** este omologat în România pentru combaterea musculiței albe de seră. În unele țări **NoFly WP** este omologat și pentru combaterea altor dăunători cum ar fi: afidele, tripsii, puricii meliferi și alte insecte dăunătoare.

Eficacitatea NoFly



Înainte de aplicarea
tratamentului



După 5 zile de la aplicarea
tratamentului

SHIGEKI este un fertilizant foliar condiționat sub formă lichidă, recomandat pentru utilizarea în culturile agricole din România.

Compoziția chimică	% w/w	% w/v
Potasiu (K ₂ O)	10,00	13,00
Fosfor (P ₂ O ₅)	7,00	9,00
Zinc (Zn-EDTA)	0,20	0,30
Fier (Fe-EDTA)	0,20	0,27
Mangan (Mn-EDTA)	0,20	0,27
Bor (B)	0,13	0,17
Cupru (Cu-EDTA)	0,10	0,13
Molibden (Mo)	0,05	0,06

Mod de acțiune

- **Fosforul**, ca și azotul, ajută la creșterea și dezvoltarea normală a plantelor de cultură. Aceste elemente au rol important în procesul de biosinteză al unor componente celulare importante cum ar fi **clorofila**, **ATP** sau **acizii nucleici**.
- **SHIGEKI** conține, de asemenea, **bor (B)** care îmbunătățește absorbția și fixarea calciului, un element cheie în întreținerea peretelui celular. Este, de asemenea, important în procesul de metabolizare a zaharurilor și diviziunea celulară (procesul de creștere).
- **Cuprul (Cu)** îmbunătățește utilizarea azotului (N) prezent în sol și ajută la sinteza proteinelor.
- **Fierul (Fe)** este important pentru procesul de fotosinteză, sinteza citocromilor și în legatura cu enzima nitrogenază (asigură disponibilitatea azotului în plantă).
- **Manganul (Mn)** este esențial pentru biosinteza clorofilei și prin urmare pentru fotosinteză.
- **Molibdenul (Mo)** este o componentă a enzimei Nitrat-reductaza (NR), transformând nitrații în nitriți (conversia azotului în aminoacizi).
- **Zincul (Zn)** activează metabolismul general al plantelor și este, de asemenea, un precursor al biosintezei triptofanului (precursor al auxinelor endogene).

Avantaje ale utilizării

- **SHIGEKI** - Efect fiziologic în plante
- Balans nutrițional: are în componență elemente nutritive esențiale și microelemente.
- Asigură o foarte bună creștere a sistemului foliar.
- Contribuie la creșterea procesului de fotosinteză și fotoasimilare.
- Îmbunătățește procesul de înflorire și fructificare.
- Asigură o dezvoltare foarte bună a sistemului radicular, ducând la o absorbție foarte bună a elementelor nutritive din sol.

Fertilizant foliar de generație superioară. Produs certificat OKO pentru utilizare și în agricultură organică

Caracteristici tehnice

- **SHIGEKI** este un fertilizant lichid de culoare maro, având miros specific, o densitate de 1,26 - 1,30 kg/L, un pH cuprins între 7,0 - 8,0 și are în componență PK (0-7-10), bor (B) și o paletă largă de microelemente chelate (chelare EDTA).
- **SHIGEKI** este recomandat a fi utilizat pentru stimularea proceselor fiziologice ale plantelor, pentru a trece mult mai ușor peste perioadele de stres fiziologic cauzat de diferiți factori biotici ori abiotici cum ar fi:
- Stres cauzat de procesul de transplantare (în cazul culturilor transplantate).
- Stresul cauzat de utilizarea unor erbicide (efect de fito-toxicitate) Ajută la reluarea proceselor fiziologice.
- Stres cauzat de fluctuații de temperatură (temperaturi scăzute, arșița din timpul verii, secetă, diferențe noapte-zi).



- Plante mai puternice: activarea sistemului endogen de apărare împotriva agenților patogeni și creșterea rezistenței la stresul abiotic.
- Induce înmugurirea naturală, evită alterarea genetică a plantelor.
- Ajută la recuperarea proceselor fiziologice și ajută planta să treacă peste stresul cauzat de transplantare.
- Recolte uniforme (fructe uniforme), plus cantitativ și calitativ.
- **SHIGEKI** poate fi aplicat pe orice cultură agricolă, prin irigare (utilizarea sistemelor de irigat prin picurare), cât și prin aplicare foliară.
- Recomandăm să se facă 2-3 aplicări (la 15-20 zile între aplicări). NU recomandăm utilizarea produsului **SHIGEKI** în tank-mix cu produse care au în compoziție calciu (Ca) sau magneziu (Mg).

Omologări în România

Cultura	Doză / Concentrație	Recomandare de aplicare
Căpșun, coacăz	1,5 - 2,0 L/ha	Începând cu fenofaza de lăstărire și se repetă aplicarea la 15 - 20 zile. Recomandăm 2 - 3 aplicări foliar sau prin irigare.
Sâmburoase	1,5 - 2,0 L/ha	La începutul lăstăritului, cu repetare la 15 - 20 zile. Recomandăm un tratament cu SHIGEKI cu 15 zile înainte de recoltare.
Viță de vie	1,5 - 2,0 L/ha	Începând cu faza de lăstărire, până când lăstarii au 20 cm. Aplicare în faza de formare a boabelor (boabele au diametrul de 4 mm). La struguri pentru masă recomandăm aplicarea unui tratament împreună cu GA3, pentru o acumulare mai bună a zaharurilor și îngroșarea epidermei boabelor - crește rezistența la păstrare.
Măr, păr	1,5 - 2,0 L/ha	2 - 3 aplicări repetate la fiecare 15 - 20 zile începând cu faza de lăstărire.
Legume transplantate	1,5 - 2,0 L/ha	2 - 3 tratamente la fiecare 15 - 20 zile după transplantare.
Cartof	1,5 - 2,0 L/ha	2 aplicări la 30 și 60 zile după răsărire.
Cucurbitacee	1,5 - 2,0 L/ha	La fiecare 15 zile în perioada de creștere vegetativă. Recomandăm 2 - 3 tratamente.
Vărzoase, salată	1,5 - 2,0 L/ha	Aplicare la 2 săptămâni după transplantare. Recomandăm 2 - 3 aplicări cu repetare la fiecare 15 - 20 zile.
Culturi hidroponice	2,0 - 3,0 L/ha	Aplicare în toată perioada de vegetație.

Cuvânt de avertizare: **ATENȚIE**

Pictograme de pericol:



shigeki

Știința și natura în slujba ta



un produs din gama


seipro
science driven by nature

PROGRAM DE TRATAMENTE


Grâu	83
Porumb	83
Floarea-soarelui	84
Rapiță	84
Cartof	85
Soia	85
Castravete	86
Varză	86
Tomate	87
Măr	87
Viță de vie	88
Căpșun	88

SUMIAGRO


PROGRAM
TRATAMENTE




Program de tratamente pentru cultura de GRÂU




Program de tratamente pentru cultura de PORUMB




Program de tratamente pentru cultura de FLOAREA-SOARELUI




Program de tratamente pentru cultura de RAPIȚĂ




Program de tratamente pentru cultura de CARTOF




Program de tratamente pentru cultura de SOIA




Program de tratamente pentru cultura de CASTRAVETE




Program de tratamente pentru cultura de VARZĂ




Program de tratamente pentru cultura de TOMATE





Program de tratamente pentru cultura de MĂR



Program de tratamente pentru cultura VIȚEI DE VIE



Program de tratamente pentru cultura de CĂPȘUNI



SUMIAGRO

UTILE

$$x^2 - 4x + 10 = 0$$

$$x - 2)(x - 5) = 0$$

$$x - 2 = 0 \vee x - 5 = 0$$

$$x = 2 \vee x = 5$$

Tabel calcul doze

Doza kg,L/ha	100 m ²	200 m ²	500 m ²	1 000 m ²	5 000 m ²	10 000 m ²
0,1 kg,L/ha	1	2	5	10	50	100
0,15 kg,L/ha	1,5	3	7,5	15	75	150
0,2 kg,L/ha	2	4	10	20	100	200
0,3 kg,L/ha	3	6	15	30	150	300
0,4 kg,L/ha	4	8	20	40	200	400
0,5 kg,L/ha	5	10	25	50	250	500
0,6 kg,L/ha	6	12	30	60	300	600
0,7 kg,L/ha	7	14	35	70	350	700
0,8 kg,L/ha	8	16	40	80	400	800
0,9 kg,L/ha	9	18	45	90	450	900
1 kg,L/ha	10	20	50	100	500	1
1,5 kg,L/ha	15	30	75	150	750	1,5
2 kg,L/ha	20	40	100	200	1	2
2,5 kg,L/ha	25	50	125	250	1,25	2,5

■ = grame sau mililitri produs

Exemplu de calcul:

La combaterea moliei viței de vie (*Lobesia botrana*), se recomandă produsul Fury 10 EC, în doză de 0,2 L/ha. Suprafața pe care dorim să tratăm este de 500 m².

■ = kilograme sau litri produs

Rezolvare:

Se merge pe coloana unde sunt dozele și se alege doza corespunzătoare (0,2 în cazul nostru). Se duce cu creionul o linie de la stânga la dreapta. Se alege de pe linia substanțelor tratate suprafața de 500 m². Din dreptul acesteia se coboară o linie orizontală. Punctul de intersecție al celor două linii este căsuța unde scrie cifra 10 cu albastru. Deci este nevoie de 10 ml Fury 10 EC pentru a proteja o suprafață de 500 m².

Volum soluție Concentrație	1 litru	10 litri	20 litri	40 litri	60 litri	80 litri	100 litri	200 litri	400 litri	600 litri	800 litri	1000 litri
0,015%	0,15	1,5	3	6	9	12	15	30	60	90	120	150
0,02%	0,20	2	4	8	12	16	20	40	80	120	160	200
0,035%	0,35	3,5	7	14	21	28	35	70	140	210	280	350
0,04%	0,4	4	8	16	24	32	40	80	160	240	320	400
0,05%	0,5	5	10	20	30	40	50	100	200	300	400	500
0,07%	0,7	7	14	28	42	56	70	140	280	420	560	700
0,1%	1	10	20	40	60	80	100	200	400	600	800	1
0,12%	1,2	12	24	48	72	96	120	240	480	720	960	1,2
0,15%	1,5	15	30	60	90	120	150	300	600	900	1,2	1,5
0,2%	2	20	40	80	120	160	200	400	800	1,2	1,6	2
0,25%	2,5	25	50	100	150	200	250	500	1	1,5	2	2,5
0,3%	3	30	60	120	180	240	300	600	1,2	1,8	2,4	3
0,4 %	4	40	80	160	240	320	400	800	1,6	2,4	3,2	4
0,5 %	5	50	100	200	300	400	500	1	2	3	4	5
0,6 %	6	60	120	240	360	480	600	1,2	2,4	3,6	4,8	6
0,75 %	7,5	75	150	300	450	600	750	1,5	3	4,5	6	7,5
0,8 %	8	80	160	320	480	640	800	1,6	3,2	4,8	6,4	8
1 %	10	100	200	400	600	800	1	2	4	6	8	10
1,5 %	15	150	300	600	900	1,2	1,5	3	6	9	12	15
2 %	20	200	400	800	1,2	1,6	2	4	8	12	16	20

Rezolvare:
Cantitatea de Topsin 70 WDG necesară pentru tratarea culturii se află la intersecția celor două linii (a concentrației - în cazul nostru 0,05%, și a volumului de soluție - 400 litri), rezultatul fiind 200 (ml Topsin 70 WDG).

A map of Romania divided into its administrative regions, each labeled with a two-letter abbreviation. The regions are: BT (Bucovina de Nord), MM (Moldova de Nord), SV (Suceava), BH (Bihor), SJ (Satmar), BN (Baneasa), IS (Iasi), NT (Neamt), VS (Vaslui), AR (Arad), CJ (Cluj), MS (Mehadia), HR (Harghita), BC (Bacau), TM (Timisoara), AB (Alba Iulia), SB (Sibiu), BV (Bistrita-Nasaud), CV (Covasna), VN (Vrancea), GL (Galați), CS (Caras-Severin), HD (Hunedoara), S8 (Salaj), AG (Arges), PH (Prahova), BZ (Buzău), BR (Brasov), TL (Tulcea), GJ (Giurgiu), VL (Valcea), DB (Dobruja), IF (Ilfov), IL (Ialoveni), MH (Mehedinti), OT (Olt), TR (Teleorman), GR (Galati), CL (Cluj), CT (Constanta), DJ (Dolj), and B (Bucharest). Red dots indicate the location of each region's capital city. The word "ROMANIA" is written vertically along the right edge of the map.

218 BAZINE
OLIMPICE

În cazul în care dispuneți de ambalaje în cantități mari, pe care doriți să le predați în afara campaniilor de colectare, vă rugăm să contactați operatorul RIGK pentru identificarea celei mai bune soluții. În funcție de cantitatea de ambalaje PPP, inspecția și colectarea se vor face direct din fermă în aprox. 24h, pentru cantități peste 30 m³, sau cu SCAPA Mobilul, pentru cantități mai mici, într-un interval de timp ce va fi comunicat ulterior, în funcție de disponibilitatea vehiculului în regiune Dvs.

TEL VERDE : 0800 872 272



Victoria Center | Calea Victoriei Nr. 145 | Etaj 5, Nivel 6
Sector 1, București, România
Telefon: 021 223 14 47 / 48 / 49
Fax: 021 223 14 92

office@sumi-agro.ro
www.sumi-agro.ro

Găsește-ne pe Facebook
Summit Agro România

